

子どもの定期予防接種の種類と対象年齢など

定期予防接種の種類	対象年齢など
ロタウイルス	ロタリックス：生後6週0日～24週0日 ロタテック：生後6週0日～32週0日
ヒブ<注1>	生後2か月～5歳未満
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満
B型肝炎	1歳未満（接種が望ましい年齢は生後2か月～9か月未満）
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ （五種混合）<注1>	（1期）生後2か月～90か月未満
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ （四種混合）<注1>	（1期）生後2か月～90か月未満
BCG	1歳未満（接種が望ましい年齢は生後5か月～8か月未満）
水痘（水ぼうそう）	1歳～3歳未満
麻しん風しん （MR）	（1期）1歳～2歳未満 （2期）小学校就学前の1年間にある人 （平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ） ※接種期間は令和7年4月1日～令和8年3月31日
日本脳炎 ＜注2＞	（1期）生後6か月～90か月未満（接種が望ましい年齢は3歳～4歳） （2期）9歳～13歳未満 ※2期の予診票は小学4年生に郵送予定です。
ジフテリア・破傷風二種混合（DT）	（2期）11歳～13歳未満 （予診票は小学校6年生へ4月に郵送しています。）
ヒトパピローマウイルス（HPV） 感染症【子宮頸がん予防】 ＜注2＞	小学校6年生～高校1年生相当の女子（ワクチンは約6か月間に3回接種もしくは2回接種） ※予診票は中学1年生の女子に郵送予定です。（小学6年生の女子は令和8年度に郵送予定です。）

<注1> 「五種混合」を接種する場合は、「四種混合とヒブ」は接種する必要はありません。

「四種混合とヒブ」を接種する場合は、「五種混合」を接種する必要はありません。

原則、「五種混合」「四種混合とヒブ」の接種は途中で変更せず4回接種となります。

<注2> 積極的な勧奨の差し控え中に接種を逃した方へ、無料接種の機会が設けられています。

【日本脳炎】

・平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれて20歳未満の人は、1期・2期ともに未接種分を接種できます。

【ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症】

・平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女子は、令和8年3月31日まで下記の条件付きで未接種分を接種できます。

『条件』 令和4年4月1日～令和7年3月31日までの間でHPVワクチンを1回以上接種した方（令和4年4月1日～令和7年3月31日以前のみの接種の方は対象外です。）