

2022(令和4)年度

伊勢市学校保健統計結果

伊勢市教育委員会事務局学校教育課
伊勢市学校保健会養護教諭部会

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. 伊勢市学校保健統計調査の概要 | 1 |
| 2. 2022(令和 4)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅰ～Ⅲ | 2～3 |
| 2022(令和 4)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅳ | 4～5 |
| 2022(令和 4)年度 検定結果 | 6 |
| 3. 伊勢市小学校 主な健康状態 年度別推移 | 7 |
| 4. 伊勢市中学校 主な健康状態 年度別推移 | 8 |
| 5. 発育状態 | |
| 年度別 年齢別 男女別 身長平均値推移・グラフ | 9～12 |
| 年度別 年齢別 男女別 体重平均値推移・グラフ | 13～16 |
| 6. 健康状態 | |
| 2022(令和 4)年度 小学校・中学校 男・女・全体 | 17 |
| 2022(令和 4)年度 小学校 年齢別 男女別 | 18 |
| 2022(令和 4)年度 中学校 年齢別 男女別 | 19 |
| 7. 健康状態 グラフ | |
| 栄養状態 | |
| やせ 年度別推移 1993(平成 5)年度～2022(令和 4)年度 | 20 |
| やせの被患率 2022(令和 4)年度 | 21 |
| 肥満 年度別推移 1993(平成 5)年度～2022(令和 4)年度 | 22 |
| 肥満の被患率 2022(令和 4)年度 | 23 |
| 視力 | |
| 年齢別視力の割合 2022(令和 4)年度 | 24 |
| 喘息 | |
| 年度別推移 1993(平成 5)年度～2022(令和 4)年度 | 25 |
| アトピー性皮膚炎 | |
| 年度別推移 1993(平成 5)年度～2022(令和 4)年度 | 26 |
| う歯 | |
| 未処置保有者の割合 年度別推移 | |
| 1980(昭和 55)年度～2022(令和 4)年度 | 27 |
| 年齢別歯の状態の割合 | 28 |

「伊勢市学校保健統計」調査の概要

1 調査の目的

この調査は、伊勢市の児童生徒の発育及び健康状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、伊勢市内の市立の小学校、中学校とする。(以下「調査実施校」という。)
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満6歳から15歳までの児童生徒を対象とする。

| | | | | | |
|------------------------|-------|----|-------|---|-------|
| 調査実施校 小学校 22校※ 中学校 10校 | | | | | |
| 2022(令和4)年度 対象人数 | | | | | |
| 小学校男子 | 2995人 | 女子 | 2874人 | 計 | 5869人 |
| 中学校男子 | 1552人 | 女子 | 1502人 | 計 | 3054人 |

3 調査事項

- ① 児童生徒の発育状態(身長・体重)に関する事項
- ② 児童生徒の健康状態(疾病・異常)に関する事項

4 調査の期日

調査は毎年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行う。なお、2020(令和2)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査体制が整わなかったため統計調査を中止した。

5 調査の方法

「伊勢市学校保健統計」は、1962(昭和37)年度より始め、1999(平成11)年からは伊勢市独自の「健康診断統計ソフト」を使用し、2021(令和3)年からは、「学校保健総合管理 えがお4」を使用している。

この「伊勢市学校保健統計」は、伊勢市教育委員会学校教育課と伊勢市学校保健会養護部会統計担当がまとめて作成するものである。

※ 2005年度の市町村合併により、小学校19校から24校、中学校9校から12校となった。

※ 2017年度の学校統合により、小学校24校から23校、中学校12校から11校となった。

※ 2019年度の学校統合により、中学校11校から10校となった。

※ 2021年度の学校統合により、小学校23校から22校となった。

2022（令和4）年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要

I 発育状態

2021（令和3）年度平均値との差は表のとおりである。

1 身長

P.9,11 参照

年齢別 身長（cm）の平均値

| 区分 | 年齢 | 男子 | | | 女子 | | |
|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | | 令和4年度 | 令和3年度 | 差 | 令和4年度 | 令和3年度 | 差 |
| 小学校 | 6歳 | 117.0 | 116.7 | 0.3 | 116.3 | 115.5 | 0.8 |
| | 7歳 | 122.8 | 122.8 | 0.0 | 121.7 | 121.7 | 0.0 |
| | 8歳 | 128.7 | 128.4 | 0.3 | 127.9 | 127.9 | 0.0 |
| | 9歳 | 134.0 | 133.6 | 0.4 | 134.7 | 134.0 | 0.7 |
| | 10歳 | 139.5 | 139.7 | △0.2 | 141.4 | 140.7 | 0.7 |
| 中学校 | 11歳 | 146.4 | 145.6 | 0.8 | 147.7 | 146.4 | 1.3 |
| | 12歳 | 153.6 | 152.9 | 0.7 | 151.3 | 151.5 | △0.2 |
| | 13歳 | 160.5 | 160.5 | 0.0 | 154.5 | 155.0 | △0.5 |
| | 14歳 | 165.9 | 166.0 | △0.1 | 156.6 | 156.2 | 0.4 |

注：△は減少していることを表す。

2 体重

P.13,15 参照

年齢別 体重（kg）の平均値

| 区分 | 年齢 | 男子 | | | 女子 | | |
|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | | 令和4年度 | 令和3年度 | 差 | 令和4年度 | 令和3年度 | 差 |
| 小学校 | 6歳 | 21.8 | 21.7 | 0.1 | 21.2 | 21.2 | 0.0 |
| | 7歳 | 24.6 | 24.8 | △0.2 | 23.9 | 23.8 | 0.1 |
| | 8歳 | 28.2 | 27.4 | 0.8 | 27.2 | 27.0 | 0.2 |
| | 9歳 | 31.0 | 31.2 | △0.2 | 31.1 | 30.7 | 0.4 |
| | 10歳 | 35.4 | 35.6 | △0.2 | 35.4 | 34.8 | 0.6 |
| 中学校 | 11歳 | 40.6 | 39.2 | 1.4 | 40.3 | 38.9 | 1.4 |
| | 12歳 | 45.0 | 43.9 | 1.1 | 43.3 | 43.8 | △0.5 |
| | 13歳 | 49.5 | 49.6 | △0.1 | 47.0 | 46.9 | 0.1 |
| | 14歳 | 55.0 | 54.4 | 0.6 | 49.4 | 49.2 | 0.2 |

注：△は減少していることを表す。

II 健康状態 ※表の番号は、P.7の「資料 2021（令和3）年度 検定結果」の番号を示しています。

1 やせ

P.20参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校 1.61% 中学校 3.33% 表1（P<0.001***）

・男女別では、差はみられない。

小学校男子 1.54% 小学校女子 1.67% 表2

中学校男子 3.42% 中学校女子 3.24% 表3

2 肥満

P.22参照

・校種別では、差はみられない。

小学校 9.30% 中学校 9.57% 表4

・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。

小学校男子 10.19% 小学校女子 8.37% 表5（P<0.05*）

中学校男子 10.82% 中学校女子 8.27% 表6（P<0.05*）

3 視力

P.24参照

<裸眼視力1.0未満：裸眼（B+C+D）+矯正（A+B+C+D）>

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校 41.48% 中学校 64.80% 表7（P<0.001***）

・男女別では、小学校・中学校とも女子の割合が高い。

小学校男子 39.42% 小学校女子 43.62% 表8（P<0.01**）

中学校男子 59.16% 中学校女子 70.64% 表9（P<0.001***）

4 歯・口腔

【う歯】

<う歯被患者>

・校種別では、小学校の割合が高い。

P.28参照

小学校 45.64% 中学校 34.08% 表10（P<0.001***）

・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。

小学校男子 46.06% 小学校女子 45.19% 表11

中学校男子 30.96% 中学校女子 37.31% 表12（P<0.001***）

<未処置歯保有者>

P.27参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

| | | | | |
|-----|--------|-----|--------|------------------|
| 小学校 | 25.68% | 中学校 | 17.99% | 表13 (P<0.001***) |
|-----|--------|-----|--------|------------------|

・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-----|
| 小学校男子 | 25.70% | 小学校女子 | 25.66% | 表14 |
|-------|--------|-------|--------|-----|

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|------------------|
| 中学校男子 | 14.99% | 中学校女子 | 21.10% | 表15 (P<0.001***) |
|-------|--------|-------|--------|------------------|

【歯肉異常】

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|----------------|
| 小学校 | 2.65% | 中学校 | 3.80% | 表16 (P<0.01**) |
|-----|-------|-----|-------|----------------|

・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 小学校男子 | 3.12% | 小学校女子 | 2.17% | 表17 (P<0.05*) |
|-------|-------|-------|-------|---------------|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 中学校男子 | 4.52% | 中学校女子 | 3.05% | 表18 (P<0.05*) |
|-------|-------|-------|-------|---------------|

8 四肢要受診者

P.17参照

・校種別では、差はみられない。

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|
| 小学校 | 0.22% | 中学校 | 0.43% | 表28 |
|-----|-------|-----|-------|-----|

・男女別でも、差はみられない。

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 小学校男子 | 0.27% | 小学校女子 | 0.17% | 表29 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 中学校男子 | 0.35% | 中学校女子 | 0.51% | 表30 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

III 主な疾病・異常の推移

P.7,8参照

本年度の疾病・異常の被患率において、う歯被患者の割合では、中学校は、過去最も低い割合となっている。小学校は、過去最も低い値であった昨年度と比較して0.1%増加した。また、小学校・中学校ともに、裸眼視力1.0未満の者の割合は、昨年度に並び、高い値となっている。

★ アトピー性皮膚炎と喘息については、医療機関で治療中または経過観察中の者。本年度の保健調査であがってくる者。

5 喘息

P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------------------|
| 小学校 | 5.52% | 中学校 | 3.87% | 表19 (P<0.001***) |
|-----|-------|-----|-------|------------------|

・小学校男女別では、小学校男子の割合が高いが、中学校男女別では、差はみられない。

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 小学校男子 | 6.95% | 小学校女子 | 4.04% | 表20 (P<0.001***) |
|-------|-------|-------|-------|------------------|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 中学校男子 | 4.52% | 中学校女子 | 3.20% | 表21 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

6 アトピー性皮膚炎

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|----------------|
| 小学校 | 6.71% | 中学校 | 8.58% | 表22 (P<0.01**) |
|-----|-------|-----|-------|----------------|

・小学校男女別では、小学校男子の割合が高いが、中学校男女別では、差はみられない。

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 小学校男子 | 7.71% | 小学校女子 | 5.67% | 表23 (P<0.01**) |
|-------|-------|-------|-------|----------------|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 中学校男子 | 8.44% | 中学校女子 | 8.72% | 表24 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

7 脊柱異常

P.17参照

・校種別では、差はみられない。

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|
| 小学校 | 0.48% | 中学校 | 0.39% | 表25 |
|-----|-------|-----|-------|-----|

・男女別でも、差はみられない。

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 小学校男子 | 0.57% | 小学校女子 | 0.38% | 表26 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 中学校男子 | 0.63% | 中学校女子 | 0.14% | 表27 |
|-------|-------|-------|-------|-----|

IV う歯の状況

1. DMFT指数


(1) 令和4年度の年齢別DMFT指数

※DMFT指数とは、
集団における1人平均う歯数のことで、
う歯には、未処置歯、処置歯、喪失歯を含む

学年が進むにつれて、DMFT指数が高くなっている。

表1

| | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DMFT指数 | 0.17 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.68 | 1.36 | 1.39 |
| むし歯のある者の割合 | 53.28 | 53.65 | 44.61 | 36.10 | 25.00 | 39.17 | 38.13 |




(2) 年齢別DMFT指数の年次推移

2015(H27)年度からの調査で、DMFT指数は比較的減少傾向にある。(表2)

表2

| | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2016(H28) | 0.42 | 0.36 | 0.63 | 0.75 | 1.06 | 1.97 | 2.01 |
| 2017(H29) | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | 1.34 | 1.50 | 2.61 |
| 2018(H30) | 0.26 | 0.34 | 0.56 | 0.68 | 1.05 | 1.57 | 1.74 |
| 2019(H31) | 0.28 | 0.30 | 0.54 | 0.65 | 1.16 | 1.34 | 2.23 |
| 2020(R2) | | | | | | | |
| 2021(R3) | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.55 | 1.02 | 1.12 | 2.05 |
| 2022(R4) | 0.17 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.68 | 1.36 | 1.37 |




(3) 中学校1年生(12歳)のDMFT指数の年次推移

伊勢市における12歳のDMFT指数は、2010年度より減少傾向にあり、「第2次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」の平成34年度DMFT目標値(1.0未満)を達成している。(表3)


表3

| | 2010(H22) | 2011(H23) | 2012(H24) | 2013(H25) | 2014(H26) | 2015(H27) | 2016(H28) | 2017(H29) | 2018(H30) | 2019(H31) | 2020(R2) | 2021(R3) | 2022(R4) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 伊勢市平均 | 3.20 | 2.00 | 1.89 | 1.80 | 1.45 | 1.50 | 1.06 | 1.34 | 1.05 | 1.16 | | 1.02 | 0.68 |
| 三重県平均 | 1.86 | 1.50 | 1.51 | 1.28 | 1.14 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | |
| 全国平均 | 1.29 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | |



2. う歯なしの割合の推移

う歯なしの年次推移をみると、小中学校ともに年々増加傾向である。割合は今年度(R4)中学校は最も高い。小学校 3178人(54.36%)、中学校 1979人(65.92%)である。



資料 2022(令和4)年度 検定結果

表1 やせ 小中学校別比較

| | | | |
|----|--------------|--------------|----------|
| やせ | 小学生 (n=5852) | 中学生 (n=2822) | χ^2 |
| | 94人 (1.61%) | 94人 (3.33%) | *** |

表2 小学校 やせ 男女別比較

| | | | |
|----|-------------|-------------|----------|
| やせ | 男子 (n=2984) | 女子 (n=2868) | χ^2 |
| | 46人 (1.54%) | 48人 (1.67%) | 有意差なし |

表3 中学校 やせ 男女別比較

| | | | |
|----|-------------|-------------|----------|
| やせ | 男子 (n=1432) | 女子 (n=1390) | χ^2 |
| | 49人 (3.42%) | 45人 (3.24%) | 有意差なし |

表4 肥満 小中学校別比較

| | | | |
|----|--------------|--------------|----------|
| 肥満 | 小学生 (n=5852) | 中学生 (n=2822) | χ^2 |
| | 544人 (9.30%) | 270人 (9.57%) | 有意差なし |

表5 小学校 肥満 男女別比較

| | | | |
|----|---------------|--------------|----------|
| 肥満 | 男子 (n=2984) | 女子 (n=2868) | χ^2 |
| | 304人 (10.19%) | 240人 (8.37%) | * |

表6 中学校 肥満 男女別比較

| | | | |
|----|---------------|--------------|----------|
| 肥満 | 男子 (n=1432) | 女子 (n=1390) | χ^2 |
| | 155人 (10.82%) | 115人 (8.27%) | * |

表7 裸眼視力1.0未満 小中学校別比較

| | | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| 視力A未満 | 小学生 (n=5844) | 中学生 (n=2957) | χ^2 |
| | 2424人 (41.48%) | 1916 (64.80%) | *** |

表8 小学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 視力A未満 | 男子 (n=2983) | 女子 (n=2861) | χ^2 |
| | 1176人 (39.42%) | 1248人 (43.62%) | ** |

表9 中学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------|
| 視力A未満 | 男子 (n=1506) | 女子 (n=1451) | χ^2 |
| | 891人 (59.16%) | 1025人 (70.64%) | *** |

表10 う歯被患者 小中学校別比較

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| う歯被患者 | 小学生 (n=5846) | 中学生 (n=3002) | χ^2 |
| | 2668人 (45.64%) | 1023人 (34.08%) | *** |

表11 小学校 う歯被患者 男女別比較

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| う歯被患者 | 男子 (n=2985) | 女子 (n=2861) | χ^2 |
| | 1375人 (46.06%) | 1293人 (45.19%) | 有意差なし |

表12 中学校 う歯被患者 男女別比較

| | | | |
|-------|---------------|---------------|----------|
| う歯被患者 | 男子 (n=1528) | 女子 (n=1474) | χ^2 |
| | 473人 (30.96%) | 550人 (37.31%) | *** |

表13 未処置歯保有者 小中学校別比較

| | | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 未処置歯保有者 | 小学生 (n=5846) | 中学生 (n=3002) | χ^2 |
| | 1501人 (25.68%) | 540人 (17.99%) | *** |

表14 小学校 未処置歯保有者 男女別比較

| | | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 未処置歯保有者 | 男子 (n=2985) | 女子 (n=2861) | χ^2 |
| | 767人 (25.70%) | 734人 (25.66%) | 有意差なし |

表15 中学校 未処置歯保有者 男女別比較

| | | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 未処置歯保有者 | 男子 (n=1528) | 女子 (n=1474) | χ^2 |
| | 229人 (14.99%) | 311人 (21.10%) | *** |

表16 歯肉異常 小中学校別比較

| | | | |
|------|--------------|--------------|----------|
| 歯肉異常 | 小学生 (n=5846) | 中学生 (n=3002) | χ^2 |
| | 155人 (2.65%) | 114人 (3.80%) | ** |

表17 小学校 歯肉異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 歯肉異常 | 男子 (n=2985) | 女子 (n=2861) | χ^2 |
| | 93人 (3.12%) | 62人 (2.17%) | * |

表18 中学校 歯肉異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 歯肉異常 | 男子 (n=1528) | 女子 (n=1474) | χ^2 |
| | 69人 (4.52%) | 45人 (3.05%) | * |

表19 喘息 小中学校別比較

| | | | |
|----|--------------|--------------|----------|
| 喘息 | 小学生 (n=5865) | 中学生 (n=3050) | χ^2 |
| | 324人 (5.52%) | 118人 (3.87%) | *** |

表20 小学校 喘息 男女別比較

| | | | |
|----|--------------|--------------|----------|
| 喘息 | 男子 (n=2992) | 女子 (n=2873) | χ^2 |
| | 208人 (6.95%) | 116人 (4.04%) | *** |

表21 中学校 喘息 男女別比較

| | | | |
|----|-------------|-------------|----------|
| 喘息 | 男子 (n=1549) | 女子 (n=1501) | χ^2 |
| | 70人 (4.52%) | 48人 (3.20%) | 有意差なし |

表22 アトピー性皮膚炎 小中学校別比較

| | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|
| アトピー性皮膚炎 | 小学生 (n=5869) | 中学生 (n=3054) | χ^2 |
| | 394人 (6.71%) | 262人 (8.58%) | ** |

表23 小学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

| | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|
| アトピー性皮膚炎 | 男子 (n=2995) | 女子 (n=2874) | χ^2 |
| | 231人 (7.71%) | 163人 (5.67%) | ** |

表24 中学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

| | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|
| アトピー性皮膚炎 | 男子 (n=1552) | 女子 (n=1502) | χ^2 |
| | 131人 (8.44%) | 131人 (8.72%) | 有意差なし |

表25 脊柱異常 小中学校別比較

| | | | |
|------|--------------|--------------|----------|
| 脊柱異常 | 小学生 (n=5848) | 中学生 (n=2801) | χ^2 |
| | 28人 (0.48%) | 11人 (0.39%) | 有意差なし |

表26 小学校 脊柱異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 脊柱異常 | 男子 (n=2983) | 女子 (n=2865) | χ^2 |
| | 17人 (0.57%) | 11人 (0.38%) | 有意差なし |

表27 中学校 脊柱異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 脊柱異常 | 男子 (n=1421) | 女子 (n=1380) | χ^2 |
| | 9人 (0.63%) | 2人 (0.14%) | 有意差なし |

表28 四肢異常 小中学校別比較

| | | | |
|------|--------------|--------------|----------|
| 四肢異常 | 小学生 (n=5848) | 中学生 (n=2801) | χ^2 |
| | 13人 (0.22%) | 12人 (0.43%) | 有意差なし |

表29 小学校 四肢異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 四肢異常 | 男子 (n=2983) | 女子 (n=2865) | χ^2 |
| | 8人 (0.27%) | 5人 (0.17%) | 有意差なし |

表30 中学校 四肢異常 男女別比較

| | | | |
|------|-------------|-------------|----------|
| 四肢異常 | 男子 (n=1421) | 女子 (n=1380) | χ^2 |
| | 5人 (0.35%) | 7人 (0.51%) | 有意差なし |

※表1～表30は「伊勢市学校保健統計」より作成

※※表7～9(視力)のnは裸眼及び矯正のA～Dを合計した数


※※※裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)

***:P<0.001

** :P<0.01

* :P<0.05


伊勢市小学校 主な健康状態の推移



| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | (S55) | (S56) | (S57) | (S58) | (S59) | (S60) | (S61) | (S62) | (S63) | (H1) | (H2) | (H3) | (H4) | (H5) | (H6) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (H12) | (H13) | (H14) | (H15) | (H16) | (H17) | (H18) | (H19) | (H20) | (H21) | (H22) | (H23) | (H24) | (H25) | (H26) | (H27) | (H28) | (H29) | (H30) | (H31) | (R2) | (R3) | (R4) | |
| ● 肥満 | 2.63 | 2.66 | 2.90 | 6.49 | 6.19 | 6.45 | 6.93 | 7.77 | 7.98 | 9.58 | 9.46 | 10.65 | 10.85 | 11.62 | 11.32 | 12.18 | 12.65 | 12.41 | 12.33 | 9.31 | 8.75 | 8.63 | 9.06 | 8.57 | 7.59 | 7.61 | 7.68 | 7.31 | 7.19 | 6.51 | 6.64 | 5.93 | 6.36 | 6.21 | 6.26 | 6.21 | 6.28 | 7.42 | 7.14 | 7.74 | | 8.31 | 9.3 | |
| ■ 裸眼視力1.0未満 | 15.23 | 13.54 | 15.32 | 16.08 | 16.28 | 17.58 | 16.70 | 17.22 | 18.66 | 17.87 | 18.27 | 17.40 | 19.11 | 19.85 | 20.11 | 22.51 | 24.25 | 24.87 | 25.82 | 26.13 | 26.53 | 26.37 | 26.42 | 27.06 | 26.60 | 27.49 | 28.80 | 29.31 | 29.59 | 29.93 | 30.55 | 30.11 | 31.99 | 32.60 | 32.17 | 32.10 | 32.10 | 33.70 | 34.81 | 34.70 | 38.01 | | 41.98 | 41.48 |
| ▲ やせ | 0.74 | 0.77 | 0.61 | 12.17 | 12.70 | 15.11 | 12.90 | 12.34 | 10.02 | 10.29 | 8.41 | 8.36 | 8.36 | 0.85 | 0.86 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.56 | 1.58 | 1.37 | 1.53 | 1.57 | 1.42 | 1.90 | 1.70 | 1.79 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 1.72 | 2.00 | 1.84 | 1.99 | 2.40 | 2.28 | 2.00 | 1.09 | 1.18 | 1.25 | | 1.35 | 1.61 | |
| ✕ 喘息 | 2.00 | 2.16 | 2.33 | 2.38 | 2.71 | 2.86 | 2.76 | 2.72 | 2.55 | 2.96 | 2.96 | 1.22 | 3.39 | 3.92 | 4.13 | 4.05 | 4.63 | 4.30 | 4.84 | 5.54 | 5.59 | 4.93 | 4.92 | 5.01 | 5.42 | 4.95 | 4.81 | 5.25 | 4.78 | 5.36 | 5.67 | 7.14 | 7.44 | 6.97 | 7.08 | 6.66 | 7.01 | 6.47 | 6.43 | 6.38 | | 5.97 | 5.52 | |
| ✖ 未処置歯 | 84.29 | 86.30 | 84.03 | 81.04 | 80.53 | 79.30 | 77.84 | 70.97 | 70.48 | 67.02 | 67.26 | 65.53 | 69.20 | 64.58 | 64.09 | 60.12 | 58.56 | 57.92 | 59.25 | 58.93 | 58.46 | 57.15 | 56.82 | 48.01 | 44.88 | 43.58 | 46.51 | 43.40 | 41.78 | 39.80 | 39.47 | 38.10 | 37.66 | 34.87 | 35.35 | 34.79 | 32.82 | 30.09 | 29.90 | 30.27 | | 25.98 | 25.68 | |
| ● う歯被患者 | 96.28 | 97.60 | 96.63 | 96.07 | 95.74 | 95.82 | 95.68 | 94.17 | 93.77 | 92.34 | 92.61 | 92.53 | 94.20 | 93.96 | 93.31 | 92.39 | 91.42 | 90.20 | 90.73 | 89.36 | 87.12 | 85.24 | 84.69 | 80.38 | 77.64 | 74.14 | 74.22 | 71.72 | 68.79 | 66.98 | 68.56 | 65.70 | 63.70 | 60.88 | 59.38 | 58.02 | 54.88 | 52.86 | 51.67 | 50.69 | | 45.54 | 45.64 | |
| ■ アトピー性皮膚炎 | | | | | | | | | | | | | 7.07 | 6.71 | 6.24 | 5.31 | 5.53 | 4.76 | 5.00 | 5.15 | 4.64 | 6.99 | 6.55 | 6.02 | 6.72 | 5.51 | 4.05 | 3.73 | 2.54 | 4.45 | 4.91 | 7.70 | 8.27 | 7.38 | 7.60 | 7.31 | 7.92 | 7.56 | 7.25 | 7.00 | | 7.47 | 6.71 | |
| 受検者数 | 10346 | 10350 | 10223 | 9922 | 9528 | 9175 | 8728 | 8341 | 8054 | 7732 | 7535 | 7304 | 7252 | 7092 | 7016 | 6962 | 6690 | 6510 | 6258 | 6132 | 5921 | 5806 | 5727 | 5634 | 5533 | 5413 | 7670 | 7541 | 7428 | 7349 | 7272 | 7156 | 6992 | 6844 | 6791 | 6591 | 6463 | 6399 | 6375 | 6255 | | 6011 | 5869 | |

① 肥満・やせについて
 ・1980～1982年度：ローレル指数で算出
 ・1983年度～：肥満度で算出
 ・1999～2016年度：1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
 ・2017年度～：身長別標準体重を求める係数と計算式を使用
 ② 1992年度～：アトピー性皮膚炎の項目が入る
 ③ 1995年度～：裸眼視力又は矯正視力のどちらかの測定になる
 ④ 裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
 ⑤ 2021年度～受検者数は調査対象者数を示す

伊勢市中学校 主な健康状態の推移



| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | (S55) | (S56) | (S57) | (S58) | (S59) | (S60) | (S61) | (S62) | (S63) | (H1) | (H2) | (H3) | (H4) | (H5) | (H6) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (H12) | (H13) | (H14) | (H15) | (H16) | (H17) | (H18) | (H19) | (H20) | (H21) | (H22) | (H23) | (H24) | (H25) | (H26) | (H27) | (H28) | (H29) | (H30) | (H31) | (R2) | (R3) | (R4) | |
| ● 肥満 | 3.31 | 2.85 | 2.99 | 6.67 | 7.03 | 6.00 | 6.97 | 7.86 | 7.73 | 7.71 | 8.95 | 8.84 | 10.12 | 9.40 | 8.89 | 7.60 | 9.31 | 10.99 | 10.84 | 10.01 | 9.50 | 9.21 | 8.79 | 8.56 | 9.23 | 8.78 | 7.99 | 8.30 | 7.92 | 7.53 | 55.86 | 58.25 | 54.52 | 54.27 | 55.52 | 53.93 | 57.86 | 58.12 | 62.04 | 61.12 | 63.32 | | 8.51 | 9.57 |
| ■ 裸眼視力1.0未満 | 36.78 | 32.10 | 31.47 | 30.82 | 31.43 | 32.32 | 34.95 | 35.17 | 35.97 | 38.24 | 37.81 | 41.28 | 45.79 | 43.41 | 44.97 | 46.22 | 47.00 | 46.32 | 50.74 | 49.02 | 51.08 | 49.72 | 49.45 | 51.13 | 52.32 | 54.61 | 56.35 | 55.30 | 57.53 | 55.86 | 58.25 | 54.52 | 54.27 | 55.52 | 53.93 | 57.86 | 58.12 | 62.04 | 61.12 | 63.32 | | 64.93 | 64.04 | |
| ▲ やせ | 2.67 | 3.56 | 3.66 | 22.97 | 21.79 | 25.72 | 25.95 | 20.64 | 21.21 | 22.35 | 17.93 | 17.08 | 16.13 | 2.31 | 2.03 | 2.49 | 2.18 | 2.23 | 1.98 | 3.51 | 2.84 | 4.32 | 4.56 | 3.89 | 3.91 | 4.98 | 5.22 | 5.01 | 4.38 | 4.01 | 4.66 | 4.55 | 4.01 | 3.99 | 4.53 | 4.79 | 4.09 | 3.57 | 3.76 | 4.13 | | 3.24 | 3.33 | |
| ✕ 喘息 | 0.49 | 0.47 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 1.79 | 2.20 | 1.78 | 2.25 | 1.71 | 2.08 | 2.12 | 2.22 | 2.67 | 2.26 | 2.41 | 2.06 | 2.68 | 3.15 | 3.09 | 3.16 | 4.43 | 4.09 | 4.94 | 3.97 | 4.37 | 3.98 | 5.23 | 4.66 | 5.29 | 5.53 | 5.66 | 5.01 | 4.39 | 4.80 | 4.63 | 3.92 | 4.23 | | 3.83 | 3.87 | |
| ✖ 未処置歯 | 71.08 | 68.92 | 68.10 | 64.11 | 67.64 | 65.07 | 64.85 | 72.19 | 72.82 | 70.96 | 66.91 | 71.21 | 69.50 | 65.10 | 62.98 | 63.80 | 59.58 | 58.09 | 55.95 | 55.34 | 47.55 | 45.90 | 43.63 | 48.92 | 48.44 | 44.86 | 41.33 | 39.92 | 40.57 | 39.46 | 49.43 | 43.97 | 39.12 | 38.21 | 36.70 | 32.33 | 28.86 | 32.15 | 26.88 | 28.36 | | 23.49 | 17.99 | |
| ● う歯被患者 | 95.76 | 95.91 | 95.77 | 95.43 | 95.34 | 95.56 | 95.10 | 95.96 | 95.90 | 95.37 | 94.44 | 95.09 | 94.78 | 95.31 | 93.79 | 93.15 | 92.33 | 92.28 | 92.00 | 90.93 | 89.29 | 84.70 | 82.39 | 82.57 | 79.68 | 77.27 | 75.00 | 73.15 | 73.31 | 70.24 | 72.80 | 67.25 | 63.49 | 60.45 | 57.69 | 54.04 | 48.22 | 49.25 | 44.02 | 43.42 | | 39.18 | 34.08 | |
| ■ アトピー性皮膚炎 | | | | | | | | | | | | | 4.57 | 3.48 | 2.62 | 2.73 | 2.44 | 2.32 | 2.35 | 2.29 | 3.42 | 3.28 | 3.97 | 4.16 | 4.16 | 4.87 | 3.30 | 4.27 | 2.58 | 2.72 | 3.32 | 8.12 | 6.52 | 5.91 | 5.98 | 6.21 | 6.60 | 6.19 | 5.52 | 6.58 | | 7.64 | 8.58 | |
| 受検者数 | 4726 | 4667 | 4951 | 4929 | 5062 | 5105 | 5121 | 4985 | 4776 | 4555 | 4311 | 4140 | 3894 | 3679 | 3500 | 3449 | 3489 | 3448 | 3441 | 3278 | 3242 | 3170 | 3070 | 2932 | 2764 | 2712 | 3755 | 3795 | 3765 | 3786 | 3670 | 3608 | 3545 | 3534 | 3530 | 3464 | 3395 | 3281 | 3191 | 3098 | | 3106 | 3054 | |

①肥満・やせについて
 ・1980～1982年度：ローレル指数で算出
 ・1983年度～：肥満度で算出
 ・1983～1992：やせは肥満度－10%以下
 ・1993～：やせは肥満度－20%以下
 ・1999～2016年度：1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
 ・2017年度～：身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～：アトピー性皮膚炎の項目が入る
 ③1995年度～：裸眼視力又は矯正視力のどちらかの測定になる
 ④裸眼視力1.0未満：裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
 ⑤2021年度～受検者数は調査対象者数を示す


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別 平均身長推移

(単位 cm)

| 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 年度 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1962 | S.37 | 112.2 | 118.1 | 122.9 | 128.0 | 133.0 | 137.6 | 143.6 | 150.2 | 156.6 | 2000 | H.12 | 116.5 | 122.4 | 127.2 | 133.8 | 138.8 | 145.3 | 152.1 | 159.7 | 165.2 |
| 1963 | S.38 | 112.9 | 117.6 | 123.9 | 128.1 | 133.0 | 139.0 | 144.0 | 152.0 | 157.2 | 2001 | H.13 | 116.2 | 122.4 | 128.0 | 132.8 | 139.0 | 145.0 | 152.4 | 159.6 | 165.5 |
| 1964 | S.39 | 113.0 | 119.1 | 123.2 | 128.7 | 133.9 | 138.7 | 144.9 | 152.3 | 158.0 | 2002 | H.14 | 116.8 | 122.2 | 128.0 | 133.4 | 138.5 | 145.3 | 151.9 | 159.8 | 165.1 |
| 1965 | S.40 | 113.9 | 120.2 | 124.4 | 129.1 | 134.7 | 138.9 | 145.7 | 152.3 | 159.7 | 2003 | H.15 | 117.0 | 122.7 | 128.0 | 133.4 | 138.8 | 144.7 | 152.1 | 159.3 | 165.2 |
| 1966 | S.41 | 113.7 | 119.7 | 124.0 | 129.7 | 134.1 | 141.2 | 146.5 | 153.2 | 159.6 | 2004 | H.16 | 116.7 | 123.0 | 128.3 | 133.3 | 138.6 | 144.9 | 152.3 | 159.5 | 165.0 |
| 1967 | S.42 | 114.1 | 119.0 | 125.2 | 129.4 | 135.0 | 139.3 | 146.4 | 154.0 | 160.1 | 2005 | H.17 | 116.6 | 122.7 | 128.4 | 133.6 | 138.9 | 144.9 | 152.1 | 159.8 | 165.4 |
| 1968 | S.43 | 114.3 | 119.7 | 124.8 | 130.7 | 134.4 | 140.4 | 146.4 | 154.3 | 160.8 | 2006 | H.18 | 116.6 | 122.5 | 128.3 | 133.6 | 138.6 | 144.8 | 152.1 | 159.9 | 165.3 |
| 1969 | S.44 | 114.1 | 120.0 | 125.5 | 130.1 | 135.9 | 140.4 | 147.4 | 154.2 | 160.4 | 2007 | H.19 | 116.6 | 122.5 | 128.0 | 133.8 | 138.8 | 145.0 | 152.0 | 159.6 | 165.2 |
| 1970 | S.45 | 114.9 | 119.7 | 125.6 | 131.0 | 134.8 | 140.8 | 146.5 | 154.1 | 159.6 | 2008 | H.20 | 117.0 | 122.6 | 128.2 | 133.4 | 139.2 | 145.0 | 152.5 | 159.3 | 165.3 |
| 1971 | S.46 | 114.9 | 120.5 | 125.4 | 130.4 | 135.7 | 141.2 | 148.6 | 155.0 | 161.8 | 2009 | H.21 | 116.3 | 123.0 | 128.1 | 133.6 | 138.6 | 145.4 | 152.3 | 160.0 | 164.8 |
| 1972 | S.47 | 115.3 | 120.8 | 126.1 | 130.6 | 135.9 | 141.7 | 148.2 | 156.3 | 161.6 | 2010 | H.22 | 116.5 | 122.1 | 128.5 | 133.3 | 139.0 | 144.6 | 152.9 | 159.5 | 165.4 |
| 1973 | S.48 | 115.1 | 121.1 | 126.1 | 131.2 | 135.8 | 141.1 | 149.1 | 155.8 | 162.7 | 2011 | H.23 | 116.8 | 122.4 | 127.6 | 133.8 | 138.6 | 145.0 | 151.9 | 159.9 | 164.7 |
| 1974 | S.49 | 114.3 | 120.2 | 126.4 | 131.0 | 136.0 | 141.0 | 149.0 | 157.6 | 162.4 | 2012 | H.24 | 116.7 | 122.8 | 128.1 | 133.0 | 139.3 | 144.9 | 152.4 | 159.2 | 165.4 |
| 1975 | S.50 | 115.2 | 120.9 | 126.4 | 132.1 | 136.0 | 142.2 | 148.5 | 156.0 | 162.6 | 2013 | H.25 | 116.5 | 122.5 | 128.2 | 133.0 | 138.4 | 145.4 | 152.0 | 159.6 | 165.0 |
| 1976 | S.51 | 115.2 | 121.0 | 126.6 | 131.5 | 137.3 | 142.3 | 149.5 | 155.8 | 162.7 | 2014 | H.26 | 116.4 | 122.7 | 128.1 | 133.3 | 139.6 | 144.8 | 152.9 | 159.2 | 165.2 |
| 1977 | S.52 | 115.3 | 120.5 | 126.3 | 131.7 | 136.5 | 142.7 | 149.0 | 157.5 | 162.3 | 2015 | H.27 | 116.5 | 122.3 | 128.2 | 133.3 | 138.7 | 145.9 | 151.9 | 160.1 | 165.0 |
| 1978 | S.53 | 115.4 | 121.0 | 126.4 | 131.5 | 136.5 | 141.8 | 150.0 | 156.7 | 163.1 | 2016 | H.28 | 116.7 | 122.4 | 128.0 | 133.6 | 138.8 | 145.1 | 153.9 | 159.1 | 165.6 |
| 1979 | S.54 | 115.5 | 121.2 | 126.6 | 131.8 | 136.7 | 142.3 | 149.4 | 157.8 | 163.0 | 2017 | H.29 | 116.7 | 122.5 | 127.8 | 133.3 | 139.1 | 145.1 | 152.9 | 159.8 | 164.9 |
| 1980 | S.55 | 115.3 | 121.4 | 126.8 | 131.6 | 137.1 | 142.5 | 149.8 | 157.4 | 163.8 | 2018 | H.30 | 116.5 | 122.7 | 128.1 | 133.0 | 138.9 | 145.5 | 152.3 | 160.5 | 165.5 |
| 1981 | S.56 | 115.5 | 121.1 | 126.9 | 132.1 | 136.9 | 142.8 | 150.0 | 157.2 | 163.6 | 2019 | H.31 | 116.5 | 122.6 | 128.3 | 133.5 | 138.5 | 145.2 | 153.1 | 159.6 | 165.6 |
| 1982 | S.57 | 116.0 | 121.4 | 126.8 | 132.2 | 137.2 | 142.4 | 149.4 | 157.6 | 163.1 | 2020 | R2 | | | | | | | | | |
| 1983 | S.58 | 116.4 | 121.8 | 127.0 | 132.2 | 137.6 | 143.1 | 150.3 | 156.8 | 163.9 | 2021 | R3 | 116.7 | 122.8 | 128.4 | 133.6 | 139.7 | 145.6 | 152.9 | 160.5 | 166.0 |
| 1984 | S.59 | 116.4 | 122.2 | 127.3 | 132.2 | 137.4 | 143.3 | 149.5 | 158.0 | 163.0 | 2022 | R4 | 117.0 | 122.8 | 128.7 | 134.0 | 139.5 | 146.4 | 153.6 | 160.5 | 165.9 |
| 1985 | S.60 | 116.1 | 122.1 | 127.6 | 132.3 | 137.2 | 142.9 | 150.3 | 157.4 | 164.1 | | | | | | | | | | | |
| 1986 | S.61 | 116.3 | 121.9 | 127.6 | 132.9 | 137.8 | 143.4 | 150.4 | 158.0 | 163.8 | | | | | | | | | | | |
| 1987 | S.62 | 116.5 | 122.0 | 127.4 | 133.2 | 138.4 | 143.8 | 150.8 | 158.1 | 164.2 | | | | | | | | | | | |
| 1988 | S.63 | 116.8 | 122.2 | 127.2 | 132.8 | 138.4 | 144.3 | 151.4 | 158.1 | 163.9 | | | | | | | | | | | |
| 1989 | H.1 | 116.5 | 122.6 | 128.1 | 133.2 | 138.1 | 144.5 | 151.8 | 158.8 | 164.8 | | | | | | | | | | | |
| 1990 | H.2 | 116.9 | 122.2 | 128.2 | 133.3 | 138.3 | 143.9 | 151.9 | 159.3 | 165.0 | | | | | | | | | | | |
| 1991 | H.3 | 116.8 | 122.8 | 127.8 | 133.4 | 138.7 | 144.4 | 151.5 | 159.7 | 165.0 | | | | | | | | | | | |
| 1992 | H.4 | 116.3 | 122.2 | 128.2 | 133.3 | 138.2 | 144.5 | 151.7 | 159.3 | 165.6 | | | | | | | | | | | |
| 1993 | H.5 | 116.6 | 121.9 | 127.8 | 133.5 | 138.4 | 144.8 | 151.6 | 159.3 | 165.3 | | | | | | | | | | | |
| 1994 | H.6 | 116.3 | 122.6 | 127.6 | 133.2 | 138.8 | 144.2 | 152.2 | 159.1 | 165.2 | | | | | | | | | | | |
| 1995 | H.7 | 116.8 | 122.1 | 128.2 | 133.0 | 138.4 | 144.8 | 151.4 | 159.8 | 165.1 | | | | | | | | | | | |
| 1996 | H.8 | 116.6 | 122.9 | 127.7 | 133.5 | 138.2 | 144.9 | 152.1 | 159.4 | 165.5 | | | | | | | | | | | |
| 1997 | H.9 | 116.6 | 122.5 | 128.1 | 133.3 | 138.6 | 144.3 | 152.0 | 159.6 | 164.9 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | H.10 | 115.7 | 122.5 | 128.1 | 133.8 | 138.8 | 145.4 | 151.6 | 160.0 | 166.1 | | | | | | | | | | | |
| 1999 | H.11 | 116.4 | 121.7 | 128.3 | 133.5 | 138.9 | 145.0 | 151.9 | 159.6 | 165.7 | | | | | | | | | | | |

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出) したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長推移（男子） 1962(昭和37)～2022(令和4)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別 平均身長推移

（単位 cm）

| 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 年度 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1962 | S.37 | 110.6 | 116.3 | 121.7 | 127.0 | 133.1 | 139.3 | 143.7 | 146.7 | 152.2 | 2000 | H.12 | 115.5 | 121.5 | 126.8 | 133.8 | 139.7 | 146.4 | 151.7 | 154.7 | 156.4 |
| 1963 | S.38 | 112.1 | 116.4 | 122.0 | 128.1 | 133.4 | 139.5 | 146.6 | 149.5 | 151.9 | 2001 | H.13 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.8 | 140.6 | 146.6 | 151.8 | 155.0 | 156.2 |
| 1964 | S.39 | 112.3 | 117.9 | 122.7 | 128.4 | 134.3 | 139.9 | 146.7 | 151.4 | 153.0 | 2002 | H.14 | 115.5 | 121.9 | 127.3 | 133.3 | 139.8 | 147.6 | 151.4 | 154.7 | 156.4 |
| 1965 | S.40 | 112.1 | 117.2 | 123.5 | 128.5 | 134.0 | 140.6 | 147.5 | 151.0 | 153.5 | 2003 | H.15 | 115.6 | 121.3 | 127.6 | 133.5 | 139.8 | 146.5 | 152.2 | 154.6 | 156.3 |
| 1966 | S.41 | 112.7 | 118.1 | 123.3 | 127.6 | 133.6 | 141.0 | 147.4 | 151.5 | 153.8 | 2004 | H.16 | 115.8 | 121.8 | 127.0 | 133.7 | 140.2 | 146.7 | 151.1 | 155.3 | 156.1 |
| 1967 | S.42 | 113.3 | 118.2 | 123.7 | 128.8 | 135.3 | 140.7 | 147.4 | 151.3 | 153.8 | 2005 | H.17 | 115.5 | 121.6 | 127.4 | 133.1 | 140.4 | 147.1 | 151.9 | 154.4 | 156.9 |
| 1968 | S.43 | 113.0 | 118.8 | 124.1 | 129.7 | 135.1 | 141.8 | 147.6 | 151.7 | 153.7 | 2006 | H.18 | 115.9 | 121.6 | 127.1 | 133.2 | 139.4 | 147.0 | 152.2 | 154.8 | 156.0 |
| 1969 | S.44 | 113.3 | 119.3 | 124.6 | 129.7 | 136.2 | 141.8 | 148.4 | 151.1 | 154.0 | 2007 | H.19 | 115.7 | 121.8 | 127.4 | 133.2 | 139.8 | 146.6 | 152.0 | 155.3 | 156.3 |
| 1970 | S.45 | 113.7 | 118.9 | 123.8 | 129.8 | 135.6 | 143.4 | 147.8 | 151.8 | 156.3 | 2008 | H.20 | 115.2 | 121.8 | 127.6 | 133.5 | 140.0 | 146.5 | 151.9 | 155.3 | 157.1 |
| 1971 | S.46 | 114.1 | 119.5 | 124.7 | 130.5 | 136.2 | 142.7 | 148.6 | 152.0 | 154.5 | 2009 | H.21 | 115.4 | 121.1 | 127.5 | 133.5 | 140.3 | 146.5 | 151.5 | 155.1 | 156.8 |
| 1972 | S.47 | 114.6 | 119.9 | 125.5 | 130.5 | 137.2 | 143.1 | 148.6 | 152.5 | 154.1 | 2010 | H.22 | 115.9 | 121.1 | 126.6 | 133.5 | 140.3 | 147.0 | 151.5 | 154.7 | 156.5 |
| 1973 | S.48 | 113.8 | 120.4 | 125.6 | 132.2 | 137.2 | 144.2 | 149.2 | 152.5 | 154.6 | 2011 | H.23 | 115.8 | 121.7 | 126.7 | 132.5 | 140.2 | 146.9 | 151.9 | 154.7 | 156.3 |
| 1974 | S.49 | 114.2 | 119.5 | 125.5 | 129.7 | 137.2 | 143.6 | 149.8 | 152.8 | 154.4 | 2012 | H.24 | 115.4 | 121.7 | 127.5 | 132.9 | 139.2 | 146.8 | 151.8 | 154.8 | 156.3 |
| 1975 | S.50 | 114.5 | 120.2 | 125.0 | 131.7 | 138.0 | 144.3 | 149.5 | 153.0 | 154.6 | 2013 | H.25 | 115.5 | 121.1 | 128.0 | 133.4 | 139.5 | 145.9 | 151.8 | 154.7 | 156.4 |
| 1976 | S.51 | 114.4 | 120.6 | 125.9 | 130.9 | 138.2 | 145.1 | 149.9 | 153.4 | 155.5 | 2014 | H.26 | 115.2 | 121.4 | 126.9 | 133.2 | 140.6 | 146.2 | 151.2 | 154.7 | 156.1 |
| 1977 | S.52 | 114.4 | 120.2 | 125.5 | 131.3 | 137.4 | 145.1 | 149.7 | 153.3 | 155.5 | 2015 | H.27 | 115.3 | 121.0 | 127.3 | 133.0 | 139.6 | 147.3 | 151.2 | 154.3 | 156.3 |
| 1978 | S.53 | 114.3 | 120.2 | 126.0 | 131.2 | 137.7 | 144.2 | 150.6 | 153.7 | 155.5 | 2016 | H.28 | 115.0 | 121.4 | 127.0 | 133.4 | 139.9 | 146.4 | 152.1 | 154.3 | 155.7 |
| 1979 | S.54 | 114.7 | 120.1 | 125.8 | 131.8 | 137.9 | 144.5 | 149.8 | 154.3 | 155.5 | 2017 | H.29 | 115.4 | 121.0 | 127.0 | 133.4 | 140.1 | 146.8 | 151.8 | 155.4 | 156.0 |
| 1980 | S.55 | 114.8 | 120.5 | 125.6 | 131.6 | 138.5 | 144.9 | 150.6 | 153.6 | 156.1 | 2018 | H.30 | 115.5 | 121.3 | 126.7 | 133.2 | 140.2 | 146.8 | 152.1 | 154.9 | 157.1 |
| 1981 | S.56 | 114.7 | 120.6 | 126.0 | 131.4 | 138.1 | 145.5 | 150.3 | 154.2 | 155.6 | 2019 | H.31 | 115.5 | 121.4 | 127.0 | 132.7 | 140.0 | 146.8 | 151.7 | 155.2 | 156.4 |
| 1982 | S.57 | 114.7 | 120.6 | 126.2 | 131.6 | 137.7 | 144.8 | 150.4 | 153.7 | 156.0 | 2020 | R.2 | | | | | | | | | |
| 1983 | S.58 | 115.2 | 120.5 | 126.3 | 132.2 | 138.5 | 144.7 | 150.4 | 154.1 | 155.8 | 2021 | R.3 | 115.5 | 121.7 | 127.9 | 134.0 | 140.7 | 146.4 | 151.5 | 155.0 | 156.2 |
| 1984 | S.59 | 115.4 | 121.0 | 126.3 | 132.0 | 138.5 | 145.4 | 150.4 | 154.1 | 155.9 | 2022 | R.4 | 116.3 | 121.7 | 127.9 | 134.7 | 141.4 | 147.7 | 151.3 | 154.5 | 156.6 |
| 1985 | S.60 | 115.5 | 121.2 | 126.5 | 131.8 | 138.6 | 145.3 | 151.3 | 154.0 | 156.0 | | | | | | | | | | | |
| 1986 | S.61 | 115.5 | 121.1 | 126.7 | 132.2 | 138.4 | 145.5 | 151.1 | 154.9 | 156.0 | | | | | | | | | | | |
| 1987 | S.62 | 115.9 | 121.2 | 126.7 | 132.5 | 138.8 | 145.2 | 151.2 | 154.9 | 156.5 | | | | | | | | | | | |
| 1988 | S.63 | 115.5 | 121.6 | 126.8 | 133.8 | 139.0 | 145.4 | 151.3 | 154.8 | 156.7 | | | | | | | | | | | |
| 1989 | H.1 | 115.7 | 121.2 | 127.5 | 132.9 | 139.5 | 146.1 | 151.6 | 154.2 | 156.7 | | | | | | | | | | | |
| 1990 | H.2 | 115.7 | 121.4 | 126.9 | 133.0 | 140.0 | 146.4 | 151.8 | 155.0 | 155.8 | | | | | | | | | | | |
| 1991 | H.3 | 115.5 | 121.8 | 127.1 | 132.4 | 139.4 | 146.3 | 151.6 | 154.7 | 156.6 | | | | | | | | | | | |
| 1992 | H.4 | 115.5 | 121.4 | 127.4 | 132.9 | 138.8 | 146.2 | 151.4 | 155.0 | 156.3 | | | | | | | | | | | |
| 1993 | H.5 | 115.6 | 121.2 | 126.8 | 133.1 | 139.3 | 145.8 | 151.9 | 155.2 | 155.8 | | | | | | | | | | | |
| 1994 | H.6 | 115.4 | 121.6 | 127.2 | 133.2 | 139.8 | 146.2 | 151.3 | 155.6 | 156.7 | | | | | | | | | | | |
| 1995 | H.7 | 114.9 | 121.2 | 127.3 | 133.3 | 140.0 | 146.6 | 151.9 | 154.8 | 157.2 | | | | | | | | | | | |
| 1996 | H.8 | 115.5 | 121.0 | 126.5 | 133.0 | 140.1 | 146.2 | 152.3 | 155.3 | 156.3 | | | | | | | | | | | |
| 1997 | H.9 | 115.8 | 121.3 | 126.8 | 132.9 | 139.8 | 147.1 | 152.0 | 155.4 | 156.8 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | H.10 | 115.5 | 122.1 | 127.1 | 132.5 | 139.8 | 146.5 | 151.7 | 155.2 | 157.2 | | | | | | | | | | | |
| 1999 | H.11 | 115.6 | 121.2 | 127.7 | 133.0 | 139.3 | 146.6 | 151.2 | 154.7 | 156.6 | | | | | | | | | | | |

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出) したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長の推移（女子） 1962(昭和37)～2022(令和4)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別平均体重の推移

(単位 kg)

| 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1962 | S.37 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 25.8 | 28.7 | 31.6 | 35.5 | 40.8 | 45.5 | 2000 | H.12 | 21.7 | 24.5 | 27.5 | 31.3 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.4 | 54.1 |
| 1963 | S.38 | 19.3 | 21.1 | 23.7 | 24.4 | 28.4 | 31.8 | 35.3 | 41.5 | 46.5 | 2001 | H.13 | 21.7 | 24.3 | 27.7 | 30.9 | 34.9 | 39.4 | 45.2 | 49.9 | 54.9 |
| 1964 | S.39 | 19.2 | 21.3 | 23.5 | 25.4 | 28.9 | 32.1 | 35.8 | 41.9 | 47.6 | 2002 | H.14 | 21.7 | 24.5 | 27.5 | 31.3 | 34.9 | 39.0 | 44.3 | 50.0 | 55.1 |
| 1965 | S.40 | 19.7 | 21.6 | 24.5 | 26.3 | 29.6 | 32.7 | 37.1 | 42.0 | 48.1 | 2003 | H.15 | 21.9 | 24.4 | 27.9 | 30.9 | 35.0 | 39.5 | 43.8 | 49.2 | 54.9 |
| 1966 | S.41 | 19.6 | 22.0 | 24.1 | 25.6 | 29.2 | 33.3 | 37.3 | 42.6 | 48.1 | 2004 | H.16 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 31.2 | 34.3 | 39.1 | 44.0 | 48.9 | 54.6 |
| 1967 | S.42 | 19.6 | 21.8 | 24.7 | 26.9 | 30.0 | 32.0 | 37.7 | 43.3 | 48.7 | 2005 | H.17 | 21.8 | 24.3 | 27.6 | 30.8 | 35.2 | 39.0 | 44.1 | 49.3 | 54.2 |
| 1968 | S.43 | 19.7 | 22.1 | 24.4 | 27.8 | 30.3 | 33.9 | 37.7 | 43.7 | 49.5 | 2006 | H.18 | 21.6 | 24.3 | 27.6 | 31.0 | 34.3 | 39.0 | 43.8 | 48.7 | 54.6 |
| 1969 | S.44 | 19.7 | 22.1 | 24.7 | 27.4 | 31.2 | 33.7 | 38.6 | 43.4 | 50.0 | 2007 | H.19 | 21.3 | 25.0 | 27.5 | 31.1 | 34.6 | 38.7 | 43.9 | 48.4 | 53.5 |
| 1970 | S.45 | 19.9 | 22.2 | 24.8 | 27.7 | 30.6 | 34.9 | 38.6 | 44.3 | 49.6 | 2008 | H.20 | 22.1 | 24.0 | 27.5 | 30.7 | 34.6 | 38.8 | 43.6 | 48.3 | 54.3 |
| 1971 | S.46 | 20.1 | 22.4 | 24.9 | 27.8 | 31.1 | 34.7 | 40.0 | 44.7 | 50.5 | 2009 | H.21 | 21.3 | 24.3 | 26.7 | 30.8 | 33.9 | 38.6 | 43.4 | 48.5 | 53.7 |
| 1972 | S.47 | 20.2 | 22.6 | 25.3 | 27.9 | 31.1 | 35.2 | 39.7 | 45.8 | 50.7 | 2010 | H.22 | 21.5 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | 34.4 | 38.2 | 43.8 | 48.5 | 53.6 |
| 1973 | S.48 | 20.3 | 22.8 | 25.3 | 28.4 | 31.3 | 35.1 | 40.4 | 45.1 | 51.6 | 2011 | H.23 | 21.5 | 24.0 | 26.8 | 30.6 | 33.3 | 38.4 | 43.0 | 48.3 | 53.3 |
| 1974 | S.49 | 19.9 | 22.3 | 25.2 | 28.7 | 31.3 | 34.1 | 39.8 | 45.9 | 50.8 | 2012 | H.24 | 21.4 | 24.3 | 27.1 | 30.2 | 34.4 | 37.7 | 43.9 | 47.8 | 53.7 |
| 1975 | S.50 | 20.4 | 22.7 | 25.6 | 28.6 | 31.7 | 35.4 | 39.7 | 45.2 | 51.0 | 2013 | H.25 | 21.3 | 24.2 | 27.2 | 30.3 | 33.6 | 38.7 | 42.6 | 48.2 | 52.9 |
| 1976 | S.51 | 20.4 | 23.0 | 25.8 | 28.8 | 32.3 | 35.7 | 40.5 | 45.0 | 51.2 | 2014 | H.26 | 21.0 | 24.1 | 27.0 | 30.5 | 34.1 | 38.1 | 43.8 | 47.2 | 53.7 |
| 1977 | S.52 | 20.2 | 22.6 | 25.5 | 28.6 | 31.9 | 35.7 | 40.2 | 46.0 | 51.3 | 2015 | H.27 | 21.2 | 23.7 | 27.2 | 30.6 | 34.2 | 38.6 | 43.3 | 48.2 | 52.5 |
| 1978 | S.53 | 20.4 | 22.7 | 25.6 | 28.5 | 32.0 | 35.6 | 41.0 | 45.9 | 51.8 | 2016 | H.28 | 21.1 | 23.8 | 26.7 | 30.8 | 34.4 | 38.6 | 44.1 | 48.2 | 53.3 |
| 1979 | S.54 | 20.6 | 23.0 | 25.3 | 28.8 | 32.1 | 36.1 | 40.8 | 46.9 | 51.7 | 2017 | H.29 | 21.6 | 23.9 | 26.8 | 30.4 | 34.5 | 38.6 | 43.8 | 48.2 | 53.0 |
| 1980 | S.55 | 20.5 | 23.2 | 25.8 | 28.3 | 32.3 | 36.2 | 41.0 | 46.2 | 52.6 | 2018 | H.30 | 21.3 | 24.3 | 26.9 | 30.2 | 34.3 | 38.9 | 43.7 | 48.6 | 53.6 |
| 1981 | S.56 | 20.8 | 23.0 | 26.1 | 28.7 | 31.6 | 36.2 | 41.3 | 46.6 | 51.8 | 2019 | H.31 | 21.4 | 24.1 | 27.6 | 30.5 | 33.8 | 39.0 | 44.4 | 48.6 | 53.5 |
| 1982 | S.57 | 20.9 | 23.3 | 25.8 | 29.2 | 32.2 | 35.4 | 41.4 | 47.1 | 52.2 | 2020 | R2 | | | | | | | | | |
| 1983 | S.58 | 21.1 | 23.5 | 26.2 | 29.0 | 32.9 | 36.2 | 41.3 | 46.6 | 52.5 | 2021 | R3 | 21.7 | 24.8 | 27.4 | 31.2 | 35.6 | 39.2 | 43.9 | 49.6 | 54.4 |
| 1984 | S.59 | 20.8 | 23.6 | 26.1 | 29.2 | 32.5 | 37.0 | 41.2 | 46.5 | 52.1 | 2022 | R4 | 21.8 | 24.6 | 28.2 | 31.0 | 35.4 | 40.6 | 45.0 | 49.5 | 55.0 |
| 1985 | S.60 | 20.9 | 23.4 | 26.6 | 29.3 | 32.8 | 36.6 | 42.0 | 47.0 | 52.1 | | | | | | | | | | | |
| 1986 | S.61 | 21.0 | 23.5 | 26.3 | 29.8 | 33.0 | 36.9 | 42.0 | 47.3 | 52.7 | | | | | | | | | | | |
| 1987 | S.62 | 21.3 | 23.5 | 26.4 | 29.7 | 33.4 | 37.0 | 42.4 | 47.3 | 53.1 | | | | | | | | | | | |
| 1988 | S.63 | 21.3 | 23.8 | 26.3 | 29.7 | 33.3 | 37.6 | 42.9 | 47.1 | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| 1989 | H.1 | 21.4 | 23.8 | 27.0 | 30.0 | 33.3 | 37.8 | 43.0 | 48.4 | 53.6 | | | | | | | | | | | |
| 1990 | H.2 | 21.9 | 23.9 | 27.1 | 30.4 | 33.6 | 37.6 | 43.4 | 48.3 | 53.7 | | | | | | | | | | | |
| 1991 | H.3 | 21.5 | 24.4 | 26.9 | 30.3 | 33.8 | 37.8 | 43.3 | 48.5 | 53.6 | | | | | | | | | | | |
| 1992 | H.4 | 21.4 | 24.3 | 27.5 | 30.2 | 33.7 | 38.1 | 43.9 | 48.5 | 53.9 | | | | | | | | | | | |
| 1993 | H.5 | 21.7 | 24.1 | 27.6 | 30.9 | 33.8 | 38.3 | 43.6 | 49.0 | 53.9 | | | | | | | | | | | |
| 1994 | H.6 | 21.6 | 24.4 | 27.3 | 31.0 | 34.4 | 37.8 | 43.7 | 48.5 | 54.4 | | | | | | | | | | | |
| 1995 | H.7 | 21.9 | 24.5 | 27.6 | 30.6 | 34.4 | 38.8 | 43.4 | 49.2 | 53.9 | | | | | | | | | | | |
| 1996 | H.8 | 21.8 | 24.8 | 27.8 | 31.1 | 34.3 | 39.1 | 44.9 | 48.7 | 54.3 | | | | | | | | | | | |
| 1997 | H.9 | 21.6 | 24.5 | 28.0 | 31.0 | 34.9 | 38.8 | 45.2 | 50.2 | 54.0 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | H.10 | 21.4 | 24.4 | 27.6 | 31.4 | 35.3 | 39.5 | 44.2 | 50.7 | 55.8 | | | | | | | | | | | |
| 1999 | H.11 | 21.7 | 24.2 | 27.8 | 31.3 | 35.5 | 39.8 | 44.3 | 49.4 | 55.9 | | | | | | | | | | | |

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（男子） 1962(昭和37)～2022(令和4)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別平均体重の推移

（単位 kg）

| 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 年度 | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1962 | S.37 | 18.5 | 20.8 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | 32.7 | 37.4 | 42.8 | 45.8 | 2000 | H.12 | 21.1 | 23.7 | 26.9 | 30.9 | 34.4 | 39.1 | 44.5 | 47.2 | 49.7 |
| 1963 | S.38 | 18.7 | 20.1 | 23.0 | 25.7 | 28.8 | 33.0 | 38.2 | 42.4 | 46.0 | 2001 | H.13 | 21.1 | 23.6 | 26.6 | 30.1 | 35.1 | 39.2 | 43.6 | 47.2 | 49.9 |
| 1964 | S.39 | 19.6 | 20.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.0 | 38.0 | 42.6 | 45.7 | 2002 | H.14 | 20.7 | 23.7 | 26.8 | 30.0 | 34.7 | 40.2 | 43.6 | 46.7 | 50.1 |
| 1965 | S.40 | 19.1 | 21.0 | 23.5 | 26.1 | 29.6 | 33.6 | 38.6 | 43.1 | 46.6 | 2003 | H.15 | 21.3 | 23.3 | 26.7 | 30.2 | 34.7 | 39.7 | 43.7 | 47.0 | 49.7 |
| 1966 | S.41 | 19.1 | 21.2 | 22.8 | 26.3 | 29.6 | 34.2 | 38.6 | 43.0 | 46.7 | 2004 | H.16 | 21.1 | 23.7 | 26.1 | 30.1 | 34.2 | 38.6 | 43.8 | 47.2 | 49.6 |
| 1967 | S.42 | 19.1 | 21.3 | 23.7 | 26.5 | 30.0 | 34.1 | 39.2 | 43.3 | 46.8 | 2005 | H.17 | 21.1 | 23.6 | 26.7 | 29.5 | 34.3 | 39.3 | 42.9 | 47.1 | 50.2 |
| 1968 | S.43 | 19.3 | 21.5 | 24.1 | 27.0 | 30.5 | 34.8 | 39.7 | 44.1 | 47.2 | 2006 | H.18 | 21.1 | 23.7 | 26.4 | 30.1 | 33.9 | 39.4 | 43.6 | 46.3 | 49.5 |
| 1969 | S.44 | 19.3 | 21.7 | 24.2 | 27.0 | 30.8 | 35.1 | 39.9 | 44.3 | 47.6 | 2007 | H.19 | 21.1 | 23.8 | 26.9 | 29.9 | 34.2 | 38.9 | 43.6 | 47.2 | 49.1 |
| 1970 | S.45 | 19.4 | 21.5 | 24.3 | 26.9 | 30.7 | 35.7 | 40.0 | 44.4 | 47.9 | 2008 | H.20 | 21.0 | 23.8 | 26.7 | 30.4 | 34.1 | 39.0 | 43.6 | 47.0 | 50.5 |
| 1971 | S.46 | 19.5 | 21.8 | 24.3 | 27.7 | 30.9 | 35.8 | 40.9 | 44.7 | 48.2 | 2009 | H.21 | 21.0 | 23.3 | 26.6 | 30.0 | 34.4 | 38.7 | 43.1 | 46.8 | 49.9 |
| 1972 | S.47 | 19.8 | 22.2 | 24.6 | 27.3 | 31.9 | 36.0 | 41.0 | 45.5 | 48.2 | 2010 | H.22 | 21.0 | 23.7 | 26.4 | 30.1 | 34.0 | 39.6 | 43.0 | 46.2 | 49.5 |
| 1973 | S.48 | 19.6 | 22.2 | 25.0 | 27.9 | 31.8 | 36.9 | 41.3 | 45.5 | 48.7 | 2011 | H.23 | 20.9 | 23.5 | 26.4 | 29.5 | 34.2 | 38.7 | 43.8 | 46.6 | 49.1 |
| 1974 | S.49 | 19.6 | 21.5 | 24.7 | 27.7 | 31.2 | 36.1 | 41.9 | 45.6 | 48.5 | 2012 | H.24 | 20.7 | 23.6 | 26.3 | 29.9 | 33.7 | 39.1 | 43.3 | 47.4 | 49.5 |
| 1975 | S.50 | 19.9 | 22.4 | 24.8 | 28.3 | 33.3 | 36.7 | 41.4 | 46.0 | 48.0 | 2013 | H.25 | 20.7 | 23.1 | 26.4 | 29.5 | 33.9 | 38.7 | 43.4 | 46.2 | 50.1 |
| 1976 | S.51 | 20.0 | 22.4 | 25.2 | 27.9 | 32.4 | 37.2 | 41.1 | 46.1 | 49.3 | 2014 | H.26 | 20.6 | 23.2 | 26.0 | 29.7 | 34.0 | 39.2 | 43.2 | 46.9 | 49.1 |
| 1977 | S.52 | 20.0 | 22.3 | 25.1 | 27.9 | 31.6 | 37.7 | 42.1 | 45.8 | 48.9 | 2015 | H.27 | 20.8 | 23.2 | 26.4 | 29.5 | 33.7 | 39.1 | 43.5 | 46.7 | 49.4 |
| 1978 | S.53 | 19.9 | 22.3 | 25.1 | 28.3 | 32.0 | 36.3 | 42.4 | 46.1 | 49.0 | 2016 | H.28 | 20.6 | 23.5 | 26.3 | 29.9 | 33.7 | 38.9 | 43.4 | 47.1 | 49.4 |
| 1979 | S.54 | 20.0 | 22.3 | 25.2 | 28.4 | 32.5 | 37.0 | 41.8 | 46.6 | 49.4 | 2017 | H.29 | 20.9 | 23.2 | 26.5 | 30.0 | 33.9 | 38.7 | 43.3 | 46.6 | 49.6 |
| 1980 | S.55 | 20.2 | 22.4 | 25.1 | 28.4 | 32.2 | 37.4 | 42.2 | 45.8 | 49.4 | 2018 | H.30 | 21.0 | 23.4 | 26.1 | 30.1 | 34.1 | 39.0 | 43.1 | 46.7 | 49.4 |
| 1981 | S.56 | 20.3 | 22.6 | 25.1 | 28.3 | 32.4 | 37.5 | 41.9 | 45.9 | 49.0 | 2019 | H.31 | 21.1 | 23.7 | 26.5 | 29.6 | 34.6 | 39.0 | 43.1 | 46.6 | 49.5 |
| 1982 | S.57 | 20.2 | 22.8 | 25.4 | 28.5 | 32.2 | 37.4 | 42.4 | 45.8 | 48.8 | 2020 | R2 | | | | | | | | | |
| 1983 | S.58 | 20.3 | 22.7 | 25.8 | 28.7 | 32.7 | 37.2 | 42.9 | 46.3 | 49.1 | 2021 | R3 | 21.2 | 23.8 | 27.0 | 30.7 | 34.8 | 38.9 | 43.8 | 46.9 | 49.2 |
| 1984 | S.59 | 20.4 | 22.9 | 25.4 | 29.1 | 32.7 | 37.7 | 42.4 | 46.6 | 49.4 | 2022 | R4 | 21.2 | 23.9 | 27.2 | 31.1 | 35.4 | 40.3 | 43.3 | 47.0 | 49.4 |
| 1985 | S.60 | 20.4 | 22.9 | 25.7 | 28.7 | 33.1 | 37.6 | 43.1 | 46.1 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| 1986 | S.61 | 20.5 | 22.9 | 25.7 | 28.9 | 32.8 | 38.4 | 43.1 | 46.9 | 49.1 | | | | | | | | | | | |
| 1987 | S.62 | 20.8 | 23.1 | 25.9 | 29.2 | 33.0 | 37.6 | 43.7 | 46.9 | 49.9 | | | | | | | | | | | |
| 1988 | S.63 | 20.7 | 23.4 | 26.0 | 29.3 | 33.6 | 38.0 | 42.7 | 47.0 | 50.0 | | | | | | | | | | | |
| 1989 | H.1 | 20.7 | 23.2 | 26.4 | 30.0 | 33.8 | 38.9 | 43.8 | 46.0 | 50.3 | | | | | | | | | | | |
| 1990 | H.2 | 20.8 | 23.2 | 26.2 | 29.8 | 34.1 | 38.9 | 43.9 | 46.8 | 48.7 | | | | | | | | | | | |
| 1991 | H.3 | 21.1 | 23.4 | 26.2 | 29.2 | 34.0 | 39.4 | 43.9 | 47.5 | 49.8 | | | | | | | | | | | |
| 1992 | H.4 | 21.3 | 23.6 | 26.4 | 29.7 | 33.5 | 39.2 | 44.2 | 47.3 | 50.2 | | | | | | | | | | | |
| 1993 | H.5 | 21.1 | 23.7 | 26.5 | 30.1 | 33.9 | 38.6 | 44.3 | 47.4 | 50.1 | | | | | | | | | | | |
| 1994 | H.6 | 21.0 | 23.7 | 26.9 | 30.1 | 34.0 | 38.9 | 43.8 | 47.5 | 50.2 | | | | | | | | | | | |
| 1995 | H.7 | 20.8 | 23.5 | 26.7 | 30.4 | 34.5 | 39.0 | 44.1 | 46.7 | 50.1 | | | | | | | | | | | |
| 1996 | H.8 | 21.1 | 23.5 | 26.5 | 30.4 | 35.4 | 39.5 | 44.4 | 47.3 | 49.6 | | | | | | | | | | | |
| 1997 | H.9 | 21.5 | 23.5 | 26.4 | 29.8 | 34.5 | 40.1 | 44.8 | 47.5 | 49.8 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | H.10 | 21.2 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 34.3 | 39.7 | 44.7 | 47.9 | 50.3 | | | | | | | | | | | |
| 1999 | H.11 | 21.2 | 23.9 | 27.4 | 30.2 | 34.0 | 39.7 | 44.0 | 47.3 | 50.3 | | | | | | | | | | | |

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移 (女子) 1962(昭和37)～2022(令和4)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)

2022(令和4)年度 健康状態 小学校・中学校 男女別 全体

| 項目 | 年齢 | 小学校男子 | (%) | 小学校女子 | (%) | 小学校合計 | (%) | 中学校男子 | (%) | 中学校女子 | (%) | 中学校合計 | (%) | |
|------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 1 | 調査対象者数 | 2995 | | 2874 | | 5869 | | 1552 | | 1502 | | 3054 | | |
| 2 脊柱 胸郭 四肢 | 受検者数 | 2983 | 99.60% | 2865 | 99.69% | 5848 | 99.64% | 1421 | 91.56% | 1380 | 91.88% | 2801 | 91.72% | |
| | ① 脊柱異常 | 17 | 0.57% | 11 | 0.38% | 28 | 0.48% | 9 | 0.63% | 2 | 0.14% | 11 | 0.39% | |
| | ② 胸郭異常 | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| | ③ 四肢異常 | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 13 | 0.22% | 5 | 0.35% | 7 | 0.51% | 12 | 0.43% | |
| 3 栄養 | 受検者数 | 2984 | 99.63% | 2868 | 99.79% | 5852 | 99.71% | 1432 | 92.27% | 1390 | 92.54% | 2822 | 92.40% | |
| | ① やせ-20%以下 | 46 | 1.54% | 48 | 1.67% | 94 | 1.61% | 49 | 3.42% | 45 | 3.24% | 94 | 3.33% | |
| | ② 軽度肥満20%以上30%未満 | 156 | 5.23% | 139 | 4.85% | 295 | 5.04% | 67 | 4.68% | 65 | 4.68% | 132 | 4.68% | |
| | ③ 中等度肥満30%以上50%未満 | 112 | 3.75% | 87 | 3.03% | 199 | 3.40% | 73 | 5.10% | 40 | 2.88% | 113 | 4.00% | |
| | ④ 高度肥満50%以上 | 36 | 1.21% | 14 | 0.49% | 50 | 0.85% | 15 | 1.05% | 10 | 0.72% | 25 | 0.89% | |
| 4 視力 | 受検者数 | 2983 | 99.60% | 2861 | 99.55% | 5844 | 99.57% | 1506 | 97.04% | 1451 | 96.60% | 2957 | 96.82% | |
| | 裸 眼 | ① A 1.0以上 | 1807 | 60.58% | 1613 | 56.38% | 3420 | 58.52% | 615 | 40.84% | 426 | 29.36% | 1041 | 35.20% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 365 | 12.24% | 343 | 11.99% | 708 | 12.11% | 127 | 8.43% | 121 | 8.34% | 248 | 8.39% |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 321 | 10.76% | 339 | 11.85% | 660 | 11.29% | 183 | 12.15% | 164 | 11.30% | 347 | 11.73% |
| | | ④ D 0.2以下 | 154 | 5.16% | 119 | 4.16% | 273 | 4.67% | 84 | 5.58% | 82 | 5.65% | 166 | 5.61% |
| | 矯 正 | ① A 1.0以上 | 91 | 3.05% | 90 | 3.15% | 181 | 3.10% | 184 | 12.22% | 231 | 15.92% | 415 | 14.03% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 94 | 3.15% | 128 | 4.47% | 222 | 3.80% | 150 | 9.96% | 197 | 13.58% | 347 | 11.73% |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 122 | 4.09% | 187 | 6.54% | 309 | 5.29% | 141 | 9.36% | 205 | 14.13% | 346 | 11.70% |
| ④ D 0.2以下 | | 29 | 0.97% | 42 | 1.47% | 71 | 1.21% | 22 | 1.46% | 25 | 1.72% | 47 | 1.59% | |
| 5 眼 | 受検者数 | 2971 | 99.20% | 2859 | 99.48% | 5830 | 99.34% | 1518 | 97.81% | 1473 | 98.07% | 2991 | 97.94% | |
| | 疾病・異常者数 | 86 | 2.89% | 76 | 2.66% | 162 | 2.78% | 39 | 2.57% | 18 | 1.22% | 57 | 1.91% | |
| 6 聴力 | 受検者数 | 1984 | 99.65% | 1866 | 99.63% | 3850 | 65.60% | 1071 | 99.54% | 1030 | 99.90% | 2101 | 68.80% | |
| | 疾病・異常者数 | 11 | 0.55% | 12 | 0.64% | 23 | 0.60% | 3 | 0.28% | 3 | 0.29% | 6 | 0.29% | |
| 7 耳 鼻 咽 頭 | 受検者数 | 932 | 99.04% | 970 | 99.69% | 1902 | 32.41% | 521 | 99.24% | 480 | 98.97% | 1001 | 32.78% | |
| | ① 耳疾患 | 73 | 7.83% | 75 | 7.73% | 148 | 7.78% | 36 | 6.91% | 22 | 4.58% | 58 | 5.79% | |
| | ② 鼻・副鼻腔疾患 | 195 | 20.92% | 124 | 12.78% | 319 | 16.77% | 112 | 21.50% | 64 | 13.33% | 176 | 17.58% | |
| | ③ 口腔咽喉頭疾患・異常 | 27 | 2.90% | 22 | 2.27% | 49 | 2.58% | 5 | 0.96% | 3 | 0.63% | 8 | 0.80% | |
| 8 皮膚 | 受検者数 | 2995 | 100.00% | 2874 | 100.00% | 5869 | 100.00% | 1552 | 100.00% | 1502 | 100.00% | 3054 | 100.00% | |
| | ① アトピー性皮膚炎 | 231 | 7.71% | 163 | 5.67% | 394 | 6.71% | 131 | 8.44% | 131 | 8.72% | 262 | 8.58% | |
| | ② その他の皮膚疾患 | 19 | 0.63% | 7 | 0.24% | 26 | 0.44% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% | 1 | 0.03% | |
| 9 心 電 図 | 受検者数 | 940 | 99.89% | 970 | 99.69% | 1910 | 32.54% | 523 | 99.62% | 484 | 99.79% | 1007 | 32.97% | |
| | 疾病・異常者数 | 86 | 9.15% | 44 | 4.54% | 130 | 6.81% | 41 | 7.84% | 27 | 5.58% | 68 | 6.75% | |
| 10 心 臓 | 受検者数 | 2986 | 99.70% | 2866 | 99.72% | 5852 | 99.71% | 1532 | 98.71% | 1483 | 98.74% | 3015 | 98.72% | |
| | 疾病・異常者数 | 59 | 1.98% | 44 | 1.54% | 103 | 1.76% | 41 | 2.68% | 33 | 2.23% | 74 | 2.45% | |
| 11 そ の 他 | 受検者数 | 2992 | 99.90% | 2873 | 99.97% | 5865 | 99.93% | 1549 | 99.81% | 1501 | 99.93% | 3050 | 99.87% | |
| | ① 喘息 | 208 | 6.95% | 116 | 4.04% | 324 | 5.52% | 70 | 4.52% | 48 | 3.20% | 118 | 3.87% | |
| | ② その他の疾病・異常 | 165 | 5.51% | 113 | 3.93% | 278 | 4.74% | 75 | 4.84% | 75 | 5.00% | 150 | 4.92% | |
| 12 歯 ・ 口 腔 | 受検者数 | 2985 | 99.67% | 2861 | 99.55% | 5846 | 99.61% | 1528 | 98.45% | 1474 | 98.14% | 3002 | 98.30% | |
| | う 歯 | ① なしの者 | 1610 | 53.94% | 1568 | 54.81% | 3178 | 54.36% | 1055 | 69.04% | 924 | 62.69% | 1979 | 65.92% |
| | | ② 処置完了者 | 608 | 20.37% | 559 | 19.54% | 1167 | 19.96% | 244 | 15.97% | 239 | 16.21% | 483 | 16.09% |
| | | ③ 未処置歯のある者 | 767 | 25.70% | 734 | 25.66% | 1501 | 25.68% | 229 | 14.99% | 311 | 21.10% | 540 | 17.99% |
| | ④ 歯列・咬合 | 163 | 5.46% | 136 | 4.75% | 299 | 5.11% | 78 | 5.10% | 77 | 5.22% | 155 | 5.16% | |
| | ⑤ 顎関節 | 4 | 0.13% | 2 | 0.07% | 6 | 0.10% | 2 | 0.13% | 2 | 0.14% | 4 | 0.13% | |
| | ⑥ 歯垢の状態 | 97 | 3.25% | 70 | 2.45% | 167 | 2.86% | 118 | 7.72% | 69 | 4.68% | 187 | 6.23% | |
| | ⑦ 歯肉異常 | 93 | 3.12% | 62 | 2.17% | 155 | 2.65% | 69 | 4.52% | 45 | 3.05% | 114 | 3.80% | |
| | ⑧ その他の疾病・異常 | 389 | 13.03% | 359 | 12.55% | 748 | 12.80% | 167 | 10.93% | 135 | 9.16% | 302 | 10.06% | |

*9-①心臓検診は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
*2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

2022(令和4)年度 健康状態年齢別男女別 -小学校-

| 項目 | 年齢 | 男子 | | | | | | | 項目 | 年齢 | 女子 | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|-------------|-------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------|---------|--------|--------|
| | | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 計 | | | % | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 計 | % | | |
| 1 | 調査対象者数 | 446 | 513 | 470 | 495 | 562 | 509 | 2995 | | 1 | 調査対象者数 | 479 | 461 | 448 | 494 | 485 | 507 | 2874 | | | |
| 2 脊柱 胸郭 四肢 | 受検者数 | 446 | 511 | 469 | 492 | 559 | 506 | 2983 | 99.60% | 2 | 受検者数 | 479 | 460 | 446 | 493 | 484 | 503 | 2865 | 99.69% | | |
| | ① 脊柱異常 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0.57% | 2 | ① 脊柱異常 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0.38% | | |
| | ② 胸郭異常 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.07% | 2 | ② 胸郭異常 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03% | | |
| | ③ 四肢異常 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.27% | 2 | ③ 四肢異常 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.17% | | |
| 3 栄養 | 受検者数 | 446 | 511 | 469 | 493 | 559 | 506 | 2984 | 99.63% | 3 | 受検者数 | 479 | 461 | 447 | 493 | 484 | 504 | 2868 | 99.79% | | |
| | ① やせ-20%以下 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 17 | 46 | 1.54% | 3 | ① やせ-20%以下 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 48 | 1.67% | | |
| | ② 軽度肥満20%以上30%未満 | 13 | 16 | 19 | 24 | 42 | 42 | 156 | 5.23% | 3 | ② 軽度肥満20%以上30%未満 | 10 | 27 | 24 | 24 | 24 | 30 | 139 | 4.85% | | |
| | ③ 中等度肥満30%以上50%未満 | 4 | 12 | 20 | 16 | 27 | 33 | 112 | 3.75% | 3 | ③ 中等度肥満30%以上50%未満 | 6 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 87 | 3.03% | | |
| ④ 高度肥満50%以上 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | 36 | 1.21% | 3 | ④ 高度肥満50%以上 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0.49% | | | |
| 4 視力 | 受検者数 | 443 | 512 | 468 | 493 | 559 | 508 | 2983 | 99.60% | 4 | 受検者数 | 477 | 460 | 448 | 491 | 480 | 505 | 2861 | 99.55% | | |
| | 裸眼 | ① A 1.0以上 | 344 | 352 | 299 | 291 | 271 | 250 | 1807 | 60.58% | 4 | 裸眼 | ① A 1.0以上 | 358 | 305 | 286 | 264 | 205 | 195 | 1613 | 56.38% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 67 | 69 | 62 | 46 | 68 | 53 | 365 | 12.24% | 4 | ② B 0.9~0.7 | 79 | 65 | 58 | 45 | 49 | 47 | 343 | 11.99% | |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 23 | 48 | 48 | 65 | 75 | 62 | 321 | 10.76% | 4 | ③ C 0.6~0.3 | 29 | 52 | 39 | 71 | 75 | 73 | 339 | 11.85% | |
| | | ④ D 0.2以下 | 3 | 21 | 23 | 34 | 33 | 40 | 154 | 5.16% | 4 | ④ D 0.2以下 | 5 | 20 | 13 | 32 | 26 | 23 | 119 | 4.16% | |
| | 矯正 | ① A 1.0以上 | 4 | 10 | 10 | 18 | 19 | 30 | 91 | 3.05% | 4 | 矯正 | ① A 1.0以上 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 37 | 90 | 3.15% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 1 | 7 | 11 | 18 | 38 | 19 | 94 | 3.15% | 4 | ② B 0.9~0.7 | 1 | 6 | 12 | 27 | 41 | 41 | 128 | 4.47% | |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 44 | 46 | 122 | 4.09% | 4 | ③ C 0.6~0.3 | 2 | 6 | 23 | 31 | 53 | 72 | 187 | 6.54% | |
| ④ D 0.2以下 | | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 29 | 0.97% | 4 | ④ D 0.2以下 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 17 | 42 | 1.47% | | |
| 5 眼 | 受検者数 | 446 | 509 | 465 | 491 | 555 | 505 | 2971 | 99.20% | 5 | 受検者数 | 477 | 460 | 446 | 489 | 482 | 505 | 2859 | 99.48% | | |
| | 疾病・異常者数 | 4 | 16 | 21 | 14 | 15 | 16 | 86 | 2.89% | 5 | 疾病・異常者数 | 10 | 16 | 6 | 11 | 17 | 16 | 76 | 2.66% | | |
| 6 聴力 | 受検者数 | 444 | 512 | 469 | | 559 | | 1984 | 99.65% | 6 | 受検者数 | 476 | 461 | 448 | | 481 | | 1866 | 99.63% | | |
| | 疾病・異常者数 | 1 | 3 | 2 | | 5 | | 11 | 0.55% | 6 | 疾病・異常者数 | 4 | 3 | 3 | | 2 | | 12 | 0.64% | | |
| 7 耳鼻 咽喉 頭 | 受検者数 | 442 | | | 490 | | | 932 | 99.04% | 7 | 受検者数 | 479 | | | 491 | | | 970 | 99.69% | | |
| | ① 耳疾患 | 46 | | | 27 | | | 73 | 7.83% | 7 | ① 耳疾患 | 49 | | | 26 | | | 75 | 7.73% | | |
| | ② 鼻・副鼻腔疾患 | 95 | | | 100 | | | 195 | 20.92% | 7 | ② 鼻・副鼻腔疾患 | 68 | | | 56 | | | 124 | 12.78% | | |
| | ③ 口腔咽喉頭疾患・異常 | 17 | | | 10 | | | 27 | 2.90% | 7 | ③ 口腔咽喉頭疾患・異常 | 13 | | | 9 | | | 22 | 2.27% | | |
| 8 皮膚 | 受検者数 | 446 | 513 | 470 | 495 | 562 | 509 | 2995 | 100.00% | 8 | 受検者数 | 479 | 461 | 448 | 494 | 485 | 507 | 2874 | 100.00% | | |
| | ① アトピー性皮膚炎 | 28 | 39 | 44 | 39 | 50 | 31 | 231 | 7.71% | 8 | ① アトピー性皮膚炎 | 22 | 35 | 21 | 38 | 23 | 24 | 163 | 5.67% | | |
| ② その他の皮膚疾患 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.63% | 8 | ② その他の皮膚疾患 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.24% | | | |
| 9 心電 図 | 受検者数 | 446 | | | 494 | | | 940 | 99.89% | 9 | 受検者数 | 477 | | | 493 | | | 970 | 99.69% | | |
| | 疾病・異常者数 | 32 | | | 54 | | | 86 | 9.15% | 9 | 疾病・異常者数 | 17 | | | 27 | | | 44 | 4.54% | | |
| 10 心臓 | 受検者数 | 446 | 511 | 469 | 493 | 559 | 508 | 2986 | 99.70% | 10 | 受検者数 | 479 | 460 | 446 | 493 | 484 | 504 | 2866 | 99.72% | | |
| | 疾病・異常者数 | 14 | 3 | 5 | 12 | 14 | 11 | 59 | 1.98% | 10 | 疾病・異常者数 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 44 | 1.54% | | |
| 11 そ の 他 | 受検者数 | 446 | 513 | 470 | 495 | 562 | 506 | 2992 | 99.90% | 11 | 受検者数 | 479 | 461 | 448 | 494 | 485 | 506 | 2873 | 99.97% | | |
| | ① 喘息 | 44 | 42 | 35 | 24 | 34 | 29 | 208 | 6.95% | 11 | ① 喘息 | 27 | 11 | 12 | 21 | 25 | 20 | 116 | 4.04% | | |
| | ② その他の疾病・異常 | 19 | 35 | 28 | 27 | 34 | 22 | 165 | 5.51% | 11 | ② その他の疾病・異常 | 22 | 27 | 14 | 19 | 16 | 15 | 113 | 3.93% | | |
| 12 歯・ 口腔 | 受検者数 | 445 | 512 | 468 | 494 | 560 | 506 | 2985 | 99.67% | 12 | 受検者数 | 478 | 460 | 446 | 492 | 480 | 505 | 2861 | 99.55% | | |
| | う 歯 | ① なしの者 | 284 | 278 | 208 | 228 | 298 | 314 | 1610 | 53.94% | 12 | う 歯 | ① なしの者 | 292 | 218 | 219 | 229 | 278 | 332 | 1568 | 54.81% |
| | | ② 処置完了者 | 51 | 95 | 114 | 122 | 127 | 99 | 608 | 20.37% | 12 | | ② 処置完了者 | 59 | 107 | 92 | 120 | 99 | 82 | 559 | 19.54% |
| | | ③ 未処置歯のある者 | 110 | 139 | 146 | 144 | 135 | 93 | 767 | 25.70% | 12 | | ③ 未処置歯のある者 | 127 | 135 | 135 | 143 | 103 | 91 | 734 | 25.66% |
| | ④ 歯列・咬合 | 2 | 53 | 38 | 24 | 25 | 21 | 163 | 5.46% | 12 | ④ 歯列・咬合 | 4 | 61 | 29 | 10 | 15 | 17 | 136 | 4.75% | | |
| | ⑤ 顎関節 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.13% | 12 | ⑤ 顎関節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.07% | | |
| | ⑥ 歯垢の状態 | 1 | 12 | 21 | 31 | 17 | 15 | 97 | 3.25% | 12 | ⑥ 歯垢の状態 | 0 | 12 | 9 | 25 | 13 | 11 | 70 | 2.45% | | |
| | ⑦ 歯肉異常 | 0 | 22 | 19 | 22 | 17 | 13 | 93 | 3.12% | 12 | ⑦ 歯肉異常 | 0 | 20 | 11 | 17 | 6 | 8 | 62 | 2.17% | | |
| ⑧ その他の疾病・異常 | 28 | 49 | 45 | 91 | 94 | 82 | 389 | 13.03% | 12 | ⑧ その他の疾病・異常 | 33 | 61 | 46 | 87 | 71 | 61 | 359 | 12.55% | | | |

*9-①心臓検診は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
*2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。


2022(令和4)年度 健康状態年齢別男女別 -中学校-

| 項目 | 年齢 | 男子 | | | | | 項目 | 年齢 | 女子 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----|-----|------|---------|-----------|-------------------|-----|-------------|------|------|---------|-----|--------|
| | | 12才 | 13才 | 14才 | 計 | (%) | | | 12才 | 13才 | 14才 | 計 | (%) | | |
| 1 調査対象者数 | | 525 | 476 | 551 | 1552 | | 1 調査対象者数 | 485 | 471 | 546 | 1502 | | | | |
| 2 脊柱胸郭四肢 | 受検者数 | 475 | 440 | 506 | 1421 | 91.56% | 2 脊柱胸郭四肢 | 受検者数 | 455 | 424 | 501 | 1380 | 91.88% | | |
| | ① 脊柱異常 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.63% | | ① 脊柱異常 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.14% | | |
| | ② 胸郭異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | ② 胸郭異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | ③ 四肢異常 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.35% | | ③ 四肢異常 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.51% | | |
| 3 栄養 | 受検者数 | 477 | 444 | 511 | 1432 | 92.27% | 3 栄養 | 受検者数 | 459 | 427 | 504 | 1390 | 92.54% | | |
| | ① やせ-20%以下 | 19 | 19 | 11 | 49 | 3.42% | | ① やせ-20%以下 | 19 | 12 | 14 | 45 | 3.24% | | |
| | ② 軽度肥満20%以上30%未満 | 32 | 18 | 17 | 67 | 4.68% | | ② 軽度肥満20%以上30%未満 | 22 | 18 | 25 | 65 | 4.68% | | |
| | ③ 中等度肥満30%以上50%未満 | 29 | 19 | 25 | 73 | 5.10% | | ③ 中等度肥満30%以上50%未満 | 16 | 14 | 10 | 40 | 2.88% | | |
| | ④ 高度肥満50%以上 | 2 | 6 | 7 | 15 | 1.05% | | ④ 高度肥満50%以上 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0.72% | | |
| 4 視力 | 受検者数 | 510 | 463 | 533 | 1506 | 97.04% | 4 視力 | 受検者数 | 476 | 453 | 522 | 1451 | 96.60% | | |
| | 裸眼 | ① A 1.0以上 | 227 | 195 | 193 | 615 | | 40.84% | 裸眼 | ① A 1.0以上 | 149 | 140 | 137 | 426 | 29.36% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 42 | 39 | 46 | 127 | | 8.43% | | ② B 0.9~0.7 | 45 | 41 | 35 | 121 | 8.34% |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 63 | 58 | 62 | 183 | | 12.15% | | ③ C 0.6~0.3 | 54 | 56 | 54 | 164 | 11.30% |
| | | ④ D 0.2以下 | 26 | 25 | 33 | 84 | | 5.58% | | ④ D 0.2以下 | 36 | 25 | 21 | 82 | 5.65% |
| | 矯正 | ① A 1.0以上 | 54 | 58 | 72 | 184 | | 12.22% | 矯正 | ① A 1.0以上 | 59 | 61 | 111 | 231 | 15.92% |
| | | ② B 0.9~0.7 | 40 | 45 | 65 | 150 | | 9.96% | | ② B 0.9~0.7 | 57 | 51 | 89 | 197 | 13.58% |
| | | ③ C 0.6~0.3 | 49 | 37 | 55 | 141 | | 9.36% | | ③ C 0.6~0.3 | 72 | 69 | 64 | 205 | 14.13% |
| ④ D 0.2以下 | | 9 | 6 | 7 | 22 | 1.46% | ④ D 0.2以下 | 4 | | 10 | 11 | 25 | 1.72% | | |
| 5 眼 | 受検者数 | 523 | 458 | 537 | 1518 | 97.81% | 5 眼 | 受検者数 | 482 | 454 | 537 | 1473 | 98.07% | | |
| | 疾病・異常者数 | 15 | 9 | 15 | 39 | 2.57% | | 疾病・異常者数 | 3 | 8 | 7 | 18 | 1.22% | | |
| 6 聴力 | 受検者数 | 525 | | 546 | 1071 | 99.5% | 6 聴力 | 受検者数 | 485 | | 545 | 1030 | 99.90% | | |
| | 疾病・異常者数 | 3 | | 0 | 3 | 0.28% | | 疾病・異常者数 | 1 | | 2 | 3 | 0.29% | | |
| 7 耳鼻咽喉頭 | 受検者数 | 521 | | | 521 | 99.24% | 7 耳鼻咽喉頭 | 受検者数 | 480 | | | 480 | 98.97% | | |
| | ① 耳疾患 | 36 | | | 36 | 6.91% | | ① 耳疾患 | 22 | | | 22 | 4.58% | | |
| | ② 鼻・副鼻腔疾患 | 112 | | | 112 | 21.50% | | ② 鼻・副鼻腔疾患 | 64 | | | 64 | 13.33% | | |
| | ③ 口腔咽喉頭疾患・異常 | 5 | | | 5 | 0.96% | | ③ 口腔咽喉頭疾患・異常 | 3 | | | 3 | 0.63% | | |
| 8 皮膚 | 受検者数 | 525 | 476 | 551 | 1552 | 100.00% | 8 皮膚 | 受検者数 | 485 | 471 | 546 | 1502 | 100.00% | | |
| | ① アトピー性皮膚炎 | 50 | 36 | 45 | 131 | 8.44% | | ① アトピー性皮膚炎 | 47 | 38 | 46 | 131 | 8.72% | | |
| | ② その他の皮膚疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | ② その他の皮膚疾患 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07% | | |
| 9 心電図 | 受検者数 | 523 | | | 523 | 99.62% | 9 心電図 | 受検者数 | 484 | | | 484 | 99.79% | | |
| | 疾病・異常者数 | 41 | | | 41 | 7.84% | | 疾病・異常者数 | 27 | | | 27 | 5.58% | | |
| 10 心臓 | 受検者数 | 523 | 468 | 541 | 1532 | 98.71% | 10 心臓 | 受検者数 | 481 | 460 | 542 | 1483 | 98.74% | | |
| | 疾病・異常者数 | 21 | 9 | 11 | 41 | 2.68% | | 疾病・異常者数 | 14 | 11 | 8 | 33 | 2.23% | | |
| 11 その他 | 受検者数 | 525 | 475 | 549 | 1549 | 99.81% | 11 その他 | 受検者数 | 485 | 470 | 546 | 1501 | 99.93% | | |
| | ① 喘息 | 35 | 20 | 15 | 70 | 4.52% | | ① 喘息 | 11 | 17 | 20 | 48 | 3.20% | | |
| | ② その他の疾病・異常 | 28 | 24 | 23 | 75 | 4.84% | | ② その他の疾病・異常 | 26 | 26 | 23 | 75 | 5.00% | | |
| 12 歯・口腔 | 受検者数 | 521 | 464 | 543 | 1528 | 98.45% | 12 歯・口腔 | 受検者数 | 479 | 455 | 540 | 1474 | 98.14% | | |
| | う歯 | ① なしの者 | 398 | 297 | 360 | 1055 | | 69.04% | う歯 | ① なしの者 | 352 | 262 | 310 | 924 | 62.69% |
| | | ② 処置完了者 | 65 | 84 | 95 | 244 | | 15.97% | | ② 処置完了者 | 63 | 67 | 109 | 239 | 16.21% |
| | | ③ 未処置歯のある者 | 58 | 83 | 88 | 229 | | 14.99% | | ③ 未処置歯のある者 | 64 | 126 | 121 | 311 | 21.10% |
| | ④ 歯列・咬合 | 26 | 22 | 30 | 78 | 5.10% | | ④ 歯列・咬合 | 18 | 19 | 40 | 77 | 5.22% | | |
| | ⑤ 顎関節 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.13% | | ⑤ 顎関節 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.14% | | |
| | ⑥ 歯垢の状態 | 26 | 34 | 58 | 118 | 7.72% | | ⑥ 歯垢の状態 | 20 | 20 | 29 | 69 | 4.68% | | |
| | ⑦ 歯肉異常 | 9 | 17 | 43 | 69 | 4.52% | | ⑦ 歯肉異常 | 12 | 19 | 14 | 45 | 3.05% | | |
| | ⑧ その他の疾病・異常 | 61 | 45 | 61 | 167 | 10.93% | | ⑧ その他の疾病・異常 | 59 | 44 | 32 | 135 | 9.16% | | |

*9-①心臓検診は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
 *2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

やせ 年度別推移 1993(平成5)~2022(令和4)年度

%




伊勢市では1999(平成11)年度から、1993(平成5)年度の標準体重を使用している。

2017(平成29)年度から、身長別標準体重を求める係数と計算式を使用している。

| | 1993 (H5) | 1994 (H6) | 1995 (H7) | 1996 (H8) | 1997 (H9) | 1998 (H10) | 1999 (H11) | 2000 (H12) | 2001 (H13) | 2002 (H14) | 2003 (H15) | 2004 (H16) | 2005 (H17) | 2006 (H18) | 2007 (H19) | 2008 (H20) | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ● 小学男子 | 0.78 | 0.82 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.37 | 1.67 | 1.31 | 1.65 | 1.58 | 1.27 | 1.83 | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 2.28 | 1.75 | 1.98 | 2.05 | 2.17 | 2.51 | 2.32 | 2.29 | 1.11 | 1.33 | 1.29 | | 1.23 | 1.54 |
| □ 小学女子 | 0.91 | 0.90 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.80 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.57 | 1.58 | 1.97 | 1.60 | 1.79 | 2.01 | 1.59 | 1.91 | 1.69 | 2.02 | 1.63 | 1.80 | 2.28 | 2.23 | 1.69 | 1.08 | 1.02 | 1.21 | | 1.51 | 1.67 |
| △ 中学男子 | 2.23 | 2.02 | 2.49 | 1.70 | 2.40 | 1.91 | 3.34 | 2.15 | 4.53 | 4.98 | 3.71 | 3.47 | 3.86 | 4.34 | 4.09 | 3.95 | 3.61 | 4.00 | 3.66 | 3.68 | 3.19 | 4.47 | 5.12 | 4.52 | 3.36 | 2.85 | 3.51 | | 2.91 | 3.42 |
| * 中学女子 | 2.39 | 2.03 | 2.50 | 2.66 | 2.06 | 2.04 | 3.68 | 3.56 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 4.38 | 6.17 | 6.14 | 5.95 | 4.82 | 4.43 | 5.35 | 5.49 | 4.34 | 4.80 | 4.60 | 4.43 | 3.66 | 3.78 | 4.73 | 4.79 | | 3.64 | 3.24 |


伊勢市では1999年(H11)から平成5年度の標準体重を使用している。

やせの被患率 2022(令和4)年度




肥満 年度別推移 1993(平成5)～2022(令和4)年度

%




| | 1993 (H5) | 1994 (H6) | 1995 (H7) | 1996 (H8) | 1997 (H9) | 1998 (H10) | 1999 (H11) | 2000 (H12) | 2001 (H13) | 2002 (H14) | 2003 (H15) | 2004 (H16) | 2005 (H17) | 2006 (H18) | 2007 (H19) | 2008 (H20) | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 小学男子 | 12.39 | 12.48 | 13.86 | 13.66 | 13.42 | 13.80 | 10.44 | 9.94 | 9.54 | 9.90 | 10.06 | 8.73 | 8.42 | 8.28 | 7.97 | 7.68 | 6.81 | 7.12 | 6.40 | 6.83 | 6.84 | 6.50 | 7.01 | 6.62 | 8.38 | 8.23 | 8.01 | | 9.55 | 10.19 |
| 小学女子 | 10.85 | 10.12 | 10.40 | 11.57 | 11.31 | 10.77 | 8.10 | 7.48 | 7.67 | 8.19 | 7.06 | 6.44 | 6.78 | 7.06 | 6.37 | 6.68 | 6.22 | 6.15 | 5.43 | 5.86 | 5.55 | 6.01 | 8.37 | 5.93 | 6.43 | 6.00 | 7.46 | | 6.98 | 8.37 |
| 中学男子 | 10.47 | 9.26 | 8.45 | 10.46 | 12.47 | 11.15 | 11.75 | 10.48 | 10.70 | 10.01 | 9.76 | 9.52 | 9.43 | 8.62 | 9.22 | 8.28 | 8.26 | 7.48 | 6.94 | 7.36 | 6.58 | 6.54 | 6.24 | 7.53 | 8.27 | 8.25 | 9.97 | | 9.70 | 10.82 |
| 中学女子 | 8.29 | 8.48 | 6.74 | 8.15 | 9.48 | 10.51 | 8.17 | 8.46 | 7.62 | 7.46 | 7.24 | 8.91 | 8.08 | 7.33 | 7.35 | 7.55 | 6.78 | 6.69 | 7.09 | 7.25 | 6.17 | 6.03 | 8.27 | 6.53 | 7.26 | 6.61 | 7.31 | | 7.33 | 8.27 |


肥満の被患率 2022(令和4)年度



2022(令和4)年度 年齢別視力の割合




喘息 年度別推移 1993(平成5)～2022(令和4)年度



| | 1993 (H5) | 1994 (H6) | 1995 (H7) | 1996 (H8) | 1997 (H9) | 1998 (H10) | 1999 (H11) | 2000 (H12) | 2001 (H13) | 2002 (H14) | 2003 (H15) | 2004 (H16) | 2005 (H17) | 2006 (H18) | 2007 (H19) | 2008 (H20) | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ● 小学男子 | 4.99 | 5.28 | 5.49 | 5.70 | 4.77 | 5.79 | 6.39 | 6.86 | 6.24 | 6.44 | 6.19 | 6.64 | 6.08 | 6.04 | 6.52 | 5.98 | 6.88 | 7.20 | 9.02 | 9.57 | 9.49 | 9.27 | 8.82 | 9.18 | 8.08 | 7.77 | 7.50 | | 7.06 | 6.95 |
| ■ 小学女子 | 2.84 | 2.95 | 2.54 | 3.51 | 3.80 | 3.86 | 4.64 | 4.25 | 3.56 | 3.35 | 3.80 | 4.19 | 3.80 | 3.56 | 3.96 | 3.53 | 3.79 | 4.10 | 5.20 | 5.15 | 4.32 | 4.80 | 4.41 | 4.71 | 4.80 | 5.05 | 5.21 | | 4.81 | 4.04 |
| ▲ 中学男子 | 2.28 | 2.64 | 3.18 | 2.73 | 2.52 | 2.20 | 3.46 | 3.05 | 3.91 | 3.54 | 5.40 | 4.65 | 6.50 | 5.17 | 5.03 | 4.32 | 6.27 | 6.03 | 7.10 | 6.97 | 7.17 | 6.76 | 5.68 | 6.02 | 6.17 | 5.04 | 5.65 | | 4.88 | 4.52 |
| ✱ 中学女子 | 1.89 | 1.80 | 2.15 | 1.79 | 2.29 | 1.92 | 1.87 | 3.25 | 2.21 | 2.74 | 3.37 | 3.47 | 3.28 | 2.72 | 3.70 | 3.64 | 4.16 | 3.23 | 3.38 | 4.05 | 4.12 | 3.22 | 3.02 | 3.54 | 3.04 | 2.72 | 2.73 | | 2.78 | 3.20 |

アトピー性皮膚炎 年度別推移 1993(平成5)～2022(令和4)年度



| | 1993 (H5) | 1994 (H6) | 1995 (H7) | 1996 (H8) | 1997 (H9) | 1998 (H10) | 1999 (H11) | 2000 (H12) | 2001 (H13) | 2002 (H14) | 2003 (H15) | 2004 (H16) | 2005 (H17) | 2006 (H18) | 2007 (H19) | 2008 (H20) | 2009 (H21) | 2010 (H22) | 2011 (H23) | 2012 (H24) | 2013 (H25) | 2014 (H26) | 2015 (H27) | 2016 (H28) | 2017 (H29) | 2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ● 小学男子 | 6.44 | 5.85 | 5.10 | 4.86 | 4.77 | 5.08 | 5.13 | 5.02 | 7.41 | 6.92 | 6.72 | 7.68 | 6.26 | 4.57 | 4.03 | 2.67 | 4.80 | 5.02 | 8.77 | 8.96 | 8.15 | 8.53 | 7.76 | 8.03 | 7.99 | 7.52 | 7.16 | | 7.71 | 7.71 |
| ■ 小学女子 | 6.98 | 6.65 | 5.54 | 6.24 | 3.39 | 4.82 | 5.18 | 4.25 | 6.55 | 6.16 | 5.30 | 5.75 | 4.74 | 3.53 | 3.43 | 2.41 | 4.10 | 4.80 | 6.60 | 7.52 | 6.57 | 6.65 | 6.86 | 7.81 | 7.13 | 6.96 | 6.84 | | 7.22 | 5.67 |
| ▲ 中学男子 | 2.71 | 2.58 | 1.97 | 2.16 | 1.95 | 2.31 | 2.27 | 3.41 | 3.30 | 4.17 | 4.68 | 4.51 | 5.57 | 3.91 | 4.86 | 2.42 | 2.78 | 3.43 | 8.30 | 6.52 | 6.15 | 6.72 | 6.61 | 7.30 | 6.71 | 6.61 | 7.53 | | 7.46 | 8.44 |
| ✱ 中学女子 | 4.28 | 2.67 | 3.49 | 2.72 | 2.71 | 2.40 | 2.31 | 3.44 | 3.26 | 3.76 | 3.58 | 3.78 | 4.12 | 2.73 | 3.73 | 2.73 | 2.67 | 3.25 | 8.03 | 6.51 | 5.75 | 5.25 | 5.84 | 5.88 | 5.65 | 4.34 | 5.59 | | 7.82 | 8.72 |

未処置歯保有者の割合 年度別推移 1980(昭和55)～2022(令和4)年度



| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | (S55) | (S56) | (S57) | (S58) | (S59) | (S60) | (S61) | (S62) | (S63) | (H1) | (H2) | (H3) | (H4) | (H5) | (H6) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (H12) | (H13) | (H14) | (H15) | (H16) | (H17) | (H18) | (H19) | (H20) | (H21) | (H22) | (H23) | (H24) | (H25) | (H26) | (H27) | (H28) | (H29) | (H30) | (H31) | (R2) | (R3) | (R4) |
| 小学男子 | 85.7 | 87.5 | 85.2 | 82.2 | 80.9 | 79.8 | 78.7 | 72.1 | 71.8 | 68.1 | 67.4 | 65.9 | 70.3 | 66.1 | 65.3 | 61.3 | 60.3 | 59.0 | 59.3 | 59.0 | 58.1 | 57.6 | 57.5 | 49.1 | 45.7 | 44.5 | 48.4 | 44.7 | 42.5 | 40.6 | 40.2 | 39.9 | 39.8 | 36.2 | 37.0 | 36.5 | 34.2 | 31.6 | 31.2 | 31.1 | 25.3 | 25.7 | |
| 小学女子 | 82.8 | 85.0 | 82.7 | 79.7 | 80.0 | 78.7 | 76.8 | 69.7 | 69.0 | 65.8 | 67.1 | 65.1 | 68.0 | 62.9 | 62.8 | 58.8 | 56.6 | 56.7 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 56.6 | 56.1 | 47.0 | 44.0 | 42.7 | 44.5 | 42.1 | 41.1 | 38.9 | 38.6 | 36.2 | 35.3 | 33.4 | 33.5 | 32.9 | 31.3 | 28.4 | 28.6 | 29.4 | 26.7 | 25.6 | |
| 中学男子 | 71.7 | 66.9 | 67.3 | 62.9 | 66.8 | 64.8 | 64.2 | 71.1 | 70.6 | 68.8 | 65.6 | 69.1 | 69.7 | 64.7 | 62.8 | 62.9 | 57.7 | 57.9 | 54.5 | 53.7 | 46.5 | 45.5 | 41.5 | 46.7 | 46.9 | 44.0 | 40.2 | 39.3 | 39.5 | 39.9 | 49.0 | 45.3 | 38.6 | 36.8 | 36.3 | 31.7 | 27.9 | 31.3 | 27 | 29.1 | 20.7 | 14.9 | |
| 中学女子 | 70.4 | 70.9 | 68.8 | 65.2 | 68.4 | 65.2 | 65.0 | 73.3 | 75.2 | 73.2 | 68.1 | 73.3 | 69.2 | 65.5 | 63.1 | 64.6 | 61.4 | 58.2 | 57.4 | 57.0 | 48.5 | 46.3 | 45.9 | 51.3 | 50.5 | 45.7 | 42.4 | 40.9 | 41.7 | 39 | 49.7 | 42.4 | 39.6 | 39.6 | 37.1 | 33.0 | 29.8 | 32.5 | 26.8 | 27.5 | 26.3 | 21.1 | |

2022(令和4)年度 年齢別歯の状態の割合

