

2024(令和 6)年度

伊勢市学校保健統計結果

伊勢市教育委員会事務局学校教育課
伊勢市学校保健会養護教諭部会

目次

1. 伊勢市学校保健統計調査の概要 1

2. 2024(令和 6)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅰ～Ⅲ 2～3
2024(令和 6)年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要Ⅳ 4～5
2024(令和 6)年度検定結果 6

3. 伊勢市小学校 主な健康状態 年度別推移 7

4. 伊勢市中学校 主な健康状態 年度別推移 8

5. 発育状態
 年度別 年齢別 男女別 身長平均値推移・グラフ 9～12
 年度別 年齢別 男女別 体重平均値推移・グラフ 13～16

6. 健康状態
 2024(令和 6)年度 小学校・中学校 男・女・全体 17
 2024(令和 6)年度 小学校 年齢別 男女別 18
 2024(令和 6)年度 中学校 年齢別 男女別 19

7. 健康状態 グラフ
 栄養状態
 やせ 年度別推移 1993(平成 5)年度～2024(令和 6)年度 20
 やせの被患率 2024(令和 6)年度 21
 肥満 年度別推移 1993(平成 5)年度～2024(令和 6)年度 22
 肥満の被患率 2024(令和 6)年度 23
 視力
 年齢別視力の割合 2024(令和 6)年度 24
 喘息
 年度別推移 1993(平成 5)年度～2024(令和 6)年度 25
 アトピー性皮膚炎
 年度別推移 1993(平成 5)年度～2024(令和 6)年度 26
 う歯
 未処置保有者の割合 年度別推移
 1980(昭和 55)年度～2024(令和 6)年度 27
 年齢別歯の状態の割合 28

「伊勢市学校保健統計」調査の概要

1 調査の目的

この調査は、伊勢市の児童生徒の発育及び健康状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- ① 調査の範囲は、伊勢市内の市立の小学校、中学校とする。（以下「調査実施校」という。）
- ② 調査の対象は、調査実施校に在籍する満 6 歳から 15 歳までの児童生徒を対象とする。

調査実施校 小学校 22 校※ 中学校 10 校						
2024(令和 6)年度 対象人数						
小学校男子		2803 人	女子	2676 人	計	5479 人
中学校男子		1546 人	女子	1444 人	計	2990 人

3 調査事項

- ① 児童生徒の発育状態（身長・体重）に関する事項
- ② 児童生徒の健康状態（疾病・異常）に関する事項

4 調査の期日

調査は毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき行う。なお、2020(令和 2)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、調査体制が整わなかったため統計調査を中止した。

5 調査の方法

「伊勢市学校保健統計」は、1962(昭和 37)年度より始め、1999（平成 11）年からは伊勢市独自の「健康診断統計ソフト」を使用し、2021(令和 3)年からは、「学校保健総合管理 えがお 4」を使用している。

この「伊勢市学校保健統計」は、伊勢市教育委員会学校教育課と伊勢市学校保健会養護部会統計担当がまとめて作成するものである。

※ 2005 年度の市町村合併により、小学校 19 校から 24 校、中学校 9 校から 12 校となった。

※ 2017 年度の学校統合により、小学校 24 校から 23 校、中学校 12 校から 11 校となった。

※ 2019 年度の学校統合により、中学校 11 校から 10 校となった。

※ 2021 年度の学校統合により、小学校 23 校から 22 校となった。

2024（令和 6）年度 伊勢市学校保健統計調査結果の概要

I 発育状態

2023（令和 5）年度平均値との差は表のとおりである。

1 身長 P.9,11 参照

区 分		年齢別 身長の平均値（cm）					
		令和6年度	令和5年度	差	令和6年度	令和 5 年度	差
小学校	6歳	116.6	117.4	△0.8	115.5	116.2	△0.7
	7歳	123.2	122.9	0.3	121.8	122.2	△0.4
	8歳	128.5	128.3	0.2	128.0	127.6	0.4
	9歳	133.7	134.0	△0.3	133.8	134.1	△0.3
	10歳	139.6	139.4	0.2	140.8	141.5	△0.7
	11歳	145.7	146.2	△0.5	147.8	147.8	0.0
中学校	12歳	154.1	154.6	△0.5	152.3	152.1	0.2
	13歳	161.9	161.0	0.9	154.8	154.2	0.6
	14歳	166.2	165.5	0.7	155.8	155.9	△0.1

注：△は減少していることを表す。

2 体重 P.13,15 参照

区 分		年齢別 体重の平均値（kg）					
		令和6年度	令和5年度	差	令和6年度	令和 5 年度	差
小学校	6歳	21.4	21.9	△0.5	21.2	21.2	0.0
	7歳	24.7	24.4	0.3	23.7	23.7	0.0
	8歳	27.7	27.7	0.0	26.9	26.9	0.0
	9歳	31.2	31.7	△0.5	30.6	30.8	△0.2
	10歳	35.8	34.7	1.1	35.0	35.3	△0.3
	11歳	38.9	39.9	△1.0	40.1	40.3	△0.2
中学校	12歳	45.0	45.8	△0.8	44.0	44.2	△0.2
	13歳	50.5	49.4	1.1	46.9	46.2	0.7
	14歳	53.7	54.0	△0.3	48.4	49.3	△0.9

注：△は減少していることを表す。

II 健康状態

1 やせ P.20参照

・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	1.52%	中学校	5.06%	表1 （P<0.001***）
・男女別では、差はみられない。				
小学校男子	1.39%	小学校女子	1.65%	表2
中学校男子	5.17%	中学校女子	4.94%	表3

2 肥満 P.22参照

・校種別では、差はみられない。				
小学校	8.69%	中学校	8.43%	表4
・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。				
小学校男子	9.79%	小学校女子	7.53%	表5 （P<0.01**）
中学校男子	10.20%	中学校女子	6.55%	表6 （P<0.001***）

3 視力 P.24参照

<裸眼視力1.0未満：裸眼（B+C+D）+矯正（A+B+C+D）>				
・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	42.35%	中学校	63.93%	表7 （P<0.001***）
・男女別では、小学校・中学校とも女子の割合が高い。				
小学校男子	38.35%	小学校女子	46.53%	表8 （P<0.001***）
中学校男子	59.58%	中学校女子	68.57%	表9 （P<0.001***）

4 歯・口腔

【う歯】				
<う歯被患者>				
・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	40.47%	中学校	31.21%	表10 （P<0.001***）
・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。				
小学校男子	40.97%	小学校女子	39.95%	表11
中学校男子	28.99%	中学校女子	33.59%	表12 （P<0.01**）

<未処置歯保有者> P. 27参照

・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	23.58%	中学校	16.22%	表13 （P<0.001***）
・男女別では、差はみられない。				
小学校男子	24.39%	小学校女子	22.74%	表14
中学校男子	15.15%	中学校女子	17.36%	表15

【歯肉異常】 P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。				
小学校	1.30%	中学校	3.23%	表16 （P<0.001***）
・小学校男女別では差はみられないが、中学校男女別では男子の割合が高い。				
小学校男子	1.33%	小学校女子	1.28%	表17
中学校男子	3.89%	中学校女子	2.53%	表18 （P<0.05*）

5 喘息 P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。				
小学校	5.10%	中学校	3.85%	表19 （P<0.05*）
・男女別では、小学校・中学校とも男子の割合が高い。				
小学校男子	6.29%	小学校女子	3.85%	表20 （P<0.001***）
中学校男子	4.59%	中学校女子	3.05%	表21 （P<0.05*）

※表の番号は、P. 6 の「資料 2024(令和 6) 年度 検定結果」の番号を示しています。

6 アトピー性皮膚炎

P.17参照

・校種別では、小学校の割合が高い。

小学校	7.56%	中学校	5.42%	表22	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・男女別では、差はみられない。

小学校男子	7.85%	小学校女子	7.25%	表23
中学校男子	5.76%	中学校女子	5.06%	表24

7 脊柱異常

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校	1.04%	中学校	3.39%	表25	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・小学校男女別では、差はみられないが、中学校男女別では女子の割合が高い。

小学校男子	1.00%	小学校女子	1.09%	表26	
中学校男子	2.43%	中学校女子	4.41%	表27	(P<0.01**)

8 四肢要受診者

P.17参照

・校種別では、中学校の割合が高い。

小学校	0.22%	中学校	1.73%	表28	(P<0.001***)
-----	-------	-----	-------	-----	--------------

・小学校男女別では差はみられないが、中学校男女別では男子の割合が高い。

小学校男子	0.21%	小学校女子	0.22%	表29	
中学校男子	2.56%	中学校女子	0.84%	表30	(P<0.001***)

Ⅲ 主な疾病・異常の推移

P.7,8参照

本年度の疾病・異常の被患率において、う歯被患者の割合では、小・中学校ともに、過去最も低い割合となっている。
 また、裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校では過去最も高い割合となっており、中学校では、昨年度と比較して、0.74ポイント減少している。

★ アトピー性皮膚炎と喘息については、医療機関で治療中または経過観察中の者。
 本年度の保健調査であがってくる者。

Ⅳ う歯の状況

1. DMFT指数


(1) 令和6年度の年齢別DMFT指数

学年が進むにつれて、DMFT指数が高くなっている。

※DMFT指数とは、
集団における1人平均う歯数のことで、
う歯には、未処置歯、処置歯、喪失歯を含む

表1

	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
DMFT指数	0.14	0.20	0.29	0.43	0.64	1.13	0.90
むし歯のある者の割合	45.69	49.38	40.72	32.15	25.61	38.27	29.98




(2) 年齢別DMFT指数の年次推移

2018(H30)年度からの調査で、DMFT指数は比較的減少傾向にある。(表2)

表2

	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
2018(H30)	0.26	0.34	0.56	0.68	1.05	1.57	1.74
2019(H31)	0.28	0.30	0.54	0.65	1.16	1.34	2.23
2020(R2)							
2021(R3)	0.25	0.31	0.38	0.55	1.02	1.12	2.05
2022(R4)	0.17	0.31	0.35	0.56	0.68	1.36	1.37
2023(R5)	0.23	0.29	0.42	0.39	0.89	0.90	1.75
2024(R6)	0.14	0.20	0.29	0.43	0.64	1.13	0.90




(3) 中学校1年生(12歳)のDMFT指数の年次推移

伊勢市における12歳のDMFT指数は、2011年度より減少傾向にあり、「第2次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」の平成34(2024)年度DMFT目標値(1.0未満)を達成している。(表3)


表3

	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
伊勢市平均	2.00	1.89	1.80	1.45	1.50	1.06	1.34	1.05	1.16		1.02	0.68	0.89	0.64
三重県平均	1.50	1.51	1.28	1.14	1.19	0.98	0.96	0.84	0.86	0.79	0.74	0.61	0.71	
全国平均	1.20	1.10	1.05	1.00	0.90	0.84	0.82	0.74	0.70	0.68	0.62	0.56	0.56	



2. う歯なしの割合の推移

う歯なしの年次推移をみると、小中学校ともに年々増加傾向である。割合は今年度(R6)小学校は最も高い。小学校 3246人(59.53%)、中学校 2023人(68.79%)である。



資料 2024(令和6)年度 検定結果

表1 やせ 小中学校別比較

やせ	小学生 (n=5469)	中学生 (n=2965)	χ^2
	83人 (1.52%)	150人 (5.06%)	***

表2 小学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=2798)	女子 (n=2671)	χ^2
	39人 (1.39%)	44人 (1.65%)	有意差なし

表3 中学校 やせ 男女別比較

やせ	男子 (n=1529)	女子 (n=1436)	χ^2
	79人 (5.17%)	71人 (4.94%)	有意差なし

表4 肥満 小中学校別比較

肥満	小学生 (n=5469)	中学生 (n=2965)	χ^2
	475人 (8.69%)	250人 (8.43%)	有意差なし

表5 小学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=2798)	女子 (n=2671)	χ^2
	274人 (9.79%)	201人 (7.53%)	**

表6 中学校 肥満 男女別比較

肥満	男子 (n=1529)	女子 (n=1436)	χ^2
	156人 (10.20%)	94人 (6.55%)	***

表7 裸眼視力1.0未満 小中学校別比較

視力A未満	小学生 (n=5455)	中学生 (n=2964)	χ^2
	2310人 (42.35%)	1895人 (63.93%)	***

表8 小学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=2790)	女子 (n=2665)	χ^2
	1070人 (38.35%)	1240人 (46.53%)	***

表9 中学校 裸眼視力1.0未満 男女別比較

視力A未満	男子 (n=1529)	女子 (n=1435)	χ^2
	911人 (59.58%)	984人 (68.57%)	***

表10 う歯被患者 小中学校別比較

う歯被患者	小学生 (n=5453)	中学生 (n=2941)	χ^2
	2207人 (40.47%)	918人 (31.21%)	***

表11 小学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=2792)	女子 (n=2661)	χ^2
	1144人 (40.97%)	1063人 (39.95%)	有意差なし

表12 中学校 う歯被患者 男女別比較

う歯被患者	男子 (n=1518)	女子 (n=1423)	χ^2
	440人 (28.99%)	478人 (33.59%)	**

表13 未処置歯保有者 小中学校別比較

未処置歯保有者	小学生 (n=5453)	中学生 (n=2941)	χ^2
	1286人 (23.58%)	477人 (16.22%)	***

表14 小学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=2792)	女子 (n=2661)	χ^2
	681人 (24.39%)	605人 (22.74%)	有意差なし

表15 中学校 未処置歯保有者 男女別比較

未処置歯保有者	男子 (n=1518)	女子 (n=1423)	χ^2
	230人 (15.15%)	247人 (17.36%)	有意差なし

表16 歯肉異常 小中学校別比較

歯肉異常	小学生 (n=5453)	中学生 (n=2941)	χ^2
	71人 (1.30%)	95人 (3.23%)	***

表17 小学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=2792)	女子 (n=2661)	χ^2
	37人 (1.33%)	34人 (1.28%)	有意差なし

表18 中学校 歯肉異常 男女別比較

歯肉異常	男子 (n=1518)	女子 (n=1423)	χ^2
	59人 (3.89%)	36人 (2.53%)	*

表19 喘息 小中学校別比較

喘息	小学生 (n=5472)	中学生 (n=2990)	χ^2
	279人 (5.10%)	115人 (3.85%)	*

表20 小学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=2799)	女子 (n=2673)	χ^2
	176人 (6.29%)	103人 (3.85%)	***

表21 中学校 喘息 男女別比較

喘息	男子 (n=1546)	女子 (n=1444)	χ^2
	71人 (4.59%)	44人 (3.05%)	*

表22 アトピー性皮膚炎 小中学校別比較

アトピー性皮膚炎	小学生 (n=5479)	中学生 (n=2990)	χ^2
	414人 (7.56%)	162人 (5.42%)	***

表23 小学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=2803)	女子 (n=2676)	χ^2
	220人 (7.85%)	194人 (7.25%)	有意差なし

表24 中学校 アトピー性皮膚炎 男女別比較

アトピー性皮膚炎	男子 (n=1546)	女子 (n=1444)	χ^2
	89人 (5.76%)	73人 (5.06%)	有意差なし

表25 脊柱異常 小中学校別比較

脊柱異常	小学生 (n=5465)	中学生 (n=2951)	χ^2
	57人 (1.04%)	100人 (3.39%)	***

表26 小学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=2795)	女子 (n=2670)	χ^2
	28人 (1.00%)	29人 (1.09%)	有意差なし

表27 中学校 脊柱異常 男女別比較

脊柱異常	男子 (n=1523)	女子 (n=1428)	χ^2
	37人 (2.43%)	63人 (4.41%)	**

表28 四肢異常 小中学校別比較

四肢異常	小学生 (n=5465)	中学生 (n=2951)	χ^2
	12人 (0.22%)	51人 (1.73%)	***

表29 小学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=2795)	女子 (n=2670)	χ^2
	6人 (0.21%)	6人 (0.22%)	有意差なし

表30 中学校 四肢異常 男女別比較

四肢異常	男子 (n=1523)	女子 (n=1428)	χ^2
	39人 (2.56%)	12人 (0.84%)	***

※表1～表30は「伊勢市学校保健統計」より作成

※※表7～9(視力)のnは裸眼及び矯正のA～Dを合計した数


※※※裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)

* * * :P<0.001

* * :P<0.01

* :P<0.05

伊勢市小学校 主な健康状態の推移




①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度:ローレル指数で算出
- ・1983年度～:肥満度で算出(やせについて 1983～1992:－10%以下、1993～:－20%以下)
- ・1999～2016年度:1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～:身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～:アトピー性皮膚炎の項目を追加

- ③1995年度～:裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる
- ④裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
- ⑤2021年度～:受検者数は、調査対象者数を示す

伊勢市中学校 主な健康状態 の推移



①肥満・やせについて

- ・1980～1982年度:ローレル指数で算出
- ・1983年度～:肥満度で算出(やせについて 1983～1992:－10%以下、1993～:－20%以下)
- ・1999～2016年度:1993年度の全国健康診断結果からの標準体重を使用
- ・2017年度～:身長別標準体重を求める係数と計算式を使用

②1992年度～:アトピー性皮膚炎の項目を追加

- ③1995年度～:裸眼視力または矯正視力のどちらかの測定になる
- ④裸眼視力1.0未満:裸眼(B+C+D)+矯正(A+B+C+D)
- ⑤2021年度～:受験者数は、調査対象者数を示す


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別 平均身長推移

(単位 cm)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	112.2	118.1	122.9	128.0	133.0	137.6	143.6	150.2	156.6	2000	H.12	116.5	122.4	127.2	133.8	138.8	145.3	152.1	159.7	165.2
1963	S.38	112.9	117.6	123.9	128.1	133.0	139.0	144.0	152.0	157.2	2001	H.13	116.2	122.4	128.0	132.8	139.0	145.0	152.4	159.6	165.5
1964	S.39	113.0	119.1	123.2	128.7	133.9	138.7	144.9	152.3	158.0	2002	H.14	116.8	122.2	128.0	133.4	138.5	145.3	151.9	159.8	165.1
1965	S.40	113.9	120.2	124.4	129.1	134.7	138.9	145.7	152.3	159.7	2003	H.15	117.0	122.7	128.0	133.4	138.8	144.7	152.1	159.3	165.2
1966	S.41	113.7	119.7	124.0	129.7	134.1	141.2	146.5	153.2	159.6	2004	H.16	116.7	123.0	128.3	133.3	138.6	144.9	152.3	159.5	165.0
1967	S.42	114.1	119.0	125.2	129.4	135.0	139.3	146.4	154.0	160.1	2005	H.17	116.6	122.7	128.4	133.6	138.9	144.9	152.1	159.8	165.4
1968	S.43	114.3	119.7	124.8	130.7	134.4	140.4	146.4	154.3	160.8	2006	H.18	116.6	122.5	128.3	133.6	138.6	144.8	152.1	159.9	165.3
1969	S.44	114.1	120.0	125.5	130.1	135.9	140.4	147.4	154.2	160.4	2007	H.19	116.6	122.5	128.0	133.8	138.8	145.0	152.0	159.6	165.2
1970	S.45	114.9	119.7	125.6	131.0	134.8	140.8	146.5	154.1	159.6	2008	H.20	117.0	122.6	128.2	133.4	139.2	145.0	152.5	159.3	165.3
1971	S.46	114.9	120.5	125.4	130.4	135.7	141.2	148.6	155.0	161.8	2009	H.21	116.3	123.0	128.1	133.6	138.6	145.4	152.3	160.0	164.8
1972	S.47	115.3	120.8	126.1	130.6	135.9	141.7	148.2	156.3	161.6	2010	H.22	116.5	122.1	128.5	133.3	139.0	144.6	152.9	159.5	165.4
1973	S.48	115.1	121.1	126.1	131.2	135.8	141.1	149.1	155.8	162.7	2011	H.23	116.8	122.4	127.6	133.8	138.6	145.0	151.9	159.9	164.7
1974	S.49	114.3	120.2	126.4	131.0	136.0	141.0	149.0	157.6	162.4	2012	H.24	116.7	122.8	128.1	133.0	139.3	144.9	152.4	159.2	165.4
1975	S.50	115.2	120.9	126.4	132.1	136.0	142.2	148.5	156.0	162.6	2013	H.25	116.5	122.5	128.2	133.0	138.4	145.4	152.0	159.6	165.0
1976	S.51	115.2	121.0	126.6	131.5	137.3	142.3	149.5	155.8	162.7	2014	H.26	116.4	122.7	128.1	133.3	139.6	144.8	152.9	159.2	165.2
1977	S.52	115.3	120.5	126.3	131.7	136.5	142.7	149.0	157.5	162.3	2015	H.27	116.5	122.3	128.2	133.3	138.7	145.9	151.9	160.1	165.0
1978	S.53	115.4	121.0	126.4	131.5	136.5	141.8	150.0	156.7	163.1	2016	H.28	116.7	122.4	128.0	133.6	138.8	145.1	153.9	159.1	165.6
1979	S.54	115.5	121.2	126.6	131.8	136.7	142.3	149.4	157.8	163.0	2017	H.29	116.7	122.5	127.8	133.3	139.1	145.1	152.9	159.8	164.9
1980	S.55	115.3	121.4	126.8	131.6	137.1	142.5	149.8	157.4	163.8	2018	H.30	116.5	122.7	128.1	133.0	138.9	145.5	152.3	160.5	165.5
1981	S.56	115.5	121.1	126.9	132.1	136.9	142.8	150.0	157.2	163.6	2019	H.31	116.5	122.6	128.3	133.5	138.5	145.2	153.1	159.6	165.6
1982	S.57	116.0	121.4	126.8	132.2	137.2	142.4	149.4	157.6	163.1	2020	R.2									
1983	S.58	116.4	121.8	127.0	132.2	137.6	143.1	150.3	156.8	163.9	2021	R.3	116.7	122.8	128.4	133.6	139.7	145.6	152.9	160.5	166.0
1984	S.59	116.4	122.2	127.3	132.2	137.4	143.3	149.5	158.0	163.0	2022	R.4	117.0	122.8	128.7	134.0	139.5	146.4	153.6	160.5	165.9
1985	S.60	116.1	122.1	127.6	132.3	137.2	142.9	150.3	157.4	164.1	2023	R.5	117.4	122.9	128.3	134.0	139.4	146.2	154.6	161.0	165.5
1986	S.61	116.3	121.9	127.6	132.9	137.8	143.4	150.4	158.0	163.8	2024	R.6	116.6	123.2	128.5	133.7	139.6	145.7	154.1	161.9	166.2
1987	S.62	116.5	122.0	127.4	133.2	138.4	143.8	150.8	158.1	164.2											
1988	S.63	116.8	122.2	127.2	132.8	138.4	144.3	151.4	158.1	163.9											
1989	H.1	116.5	122.6	128.1	133.2	138.1	144.5	151.8	158.8	164.8											
1990	H.2	116.9	122.2	128.2	133.3	138.3	143.9	151.9	159.3	165.0											
1991	H.3	116.8	122.8	127.8	133.4	138.7	144.4	151.5	159.7	165.0											
1992	H.4	116.3	122.2	128.2	133.3	138.2	144.5	151.7	159.3	165.6											
1993	H.5	116.6	121.9	127.8	133.5	138.4	144.8	151.6	159.3	165.3											
1994	H.6	116.3	122.6	127.6	133.2	138.8	144.2	152.2	159.1	165.2											
1995	H.7	116.8	122.1	128.2	133.0	138.4	144.8	151.4	159.8	165.1											
1996	H.8	116.6	122.9	127.7	133.5	138.2	144.9	152.1	159.4	165.5											
1997	H.9	116.6	122.5	128.1	133.3	138.6	144.3	152.0	159.6	164.9											
1998	H.10	115.7	122.5	128.1	133.8	138.8	145.4	151.6	160.0	166.1											
1999	H.11	116.4	121.7	128.3	133.5	138.9	145.0	151.9	159.6	165.7											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出) したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長の推移（男子） 1962(昭和37)～2024(令和6)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別 平均身長推移

（単位 cm）

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	110.6	116.3	121.7	127.0	133.1	139.3	143.7	146.7	152.2	2000	H.12	115.5	121.5	126.8	133.8	139.7	146.4	151.7	154.7	156.4
1963	S.38	112.1	116.4	122.0	128.1	133.4	139.5	146.6	149.5	151.9	2001	H.13	116.0	121.6	127.3	132.8	140.6	146.6	151.8	155.0	156.2
1964	S.39	112.3	117.9	122.7	128.4	134.3	139.9	146.7	151.4	153.0	2002	H.14	115.5	121.9	127.3	133.3	139.8	147.6	151.4	154.7	156.4
1965	S.40	112.1	117.2	123.5	128.5	134.0	140.6	147.5	151.0	153.5	2003	H.15	115.6	121.3	127.6	133.5	139.8	146.5	152.2	154.6	156.3
1966	S.41	112.7	118.1	123.3	127.6	133.6	141.0	147.4	151.5	153.8	2004	H.16	115.8	121.8	127.0	133.7	140.2	146.7	151.1	155.3	156.1
1967	S.42	113.3	118.2	123.7	128.8	135.3	140.7	147.4	151.3	153.8	2005	H.17	115.5	121.6	127.4	133.1	140.4	147.1	151.9	154.4	156.9
1968	S.43	113.0	118.8	124.1	129.7	135.1	141.8	147.6	151.7	153.7	2006	H.18	115.9	121.6	127.1	133.2	139.4	147.0	152.2	154.8	156.0
1969	S.44	113.3	119.3	124.6	129.7	136.2	141.8	148.4	151.1	154.0	2007	H.19	115.7	121.8	127.4	133.2	139.8	146.6	152.0	155.3	156.3
1970	S.45	113.7	118.9	123.8	129.8	135.6	143.4	147.8	151.8	156.3	2008	H.20	115.2	121.8	127.6	133.5	140.0	146.5	151.9	155.3	157.1
1971	S.46	114.1	119.5	124.7	130.5	136.2	142.7	148.6	152.0	154.5	2009	H.21	115.4	121.1	127.5	133.5	140.3	146.5	151.5	155.1	156.8
1972	S.47	114.6	119.9	125.5	130.5	137.2	143.1	148.6	152.5	154.1	2010	H.22	115.9	121.1	126.6	133.5	140.3	147.0	151.5	154.7	156.5
1973	S.48	113.8	120.4	125.6	132.2	137.2	144.2	149.2	152.5	154.6	2011	H.23	115.8	121.7	126.7	132.5	140.2	146.9	151.9	154.7	156.3
1974	S.49	114.2	119.5	125.5	129.7	137.2	143.6	149.8	152.8	154.4	2012	H.24	115.4	121.7	127.5	132.9	139.2	146.8	151.8	154.8	156.3
1975	S.50	114.5	120.2	125.0	131.7	138.0	144.3	149.5	153.0	154.6	2013	H.25	115.5	121.1	128.0	133.4	139.5	145.9	151.8	154.7	156.4
1976	S.51	114.4	120.6	125.9	130.9	138.2	145.1	149.9	153.4	155.5	2014	H.26	115.2	121.4	126.9	133.2	140.6	146.2	151.2	154.7	156.1
1977	S.52	114.4	120.2	125.5	131.3	137.4	145.1	149.7	153.3	155.5	2015	H.27	115.3	121.0	127.3	133.0	139.6	147.3	151.2	154.3	156.3
1978	S.53	114.3	120.2	126.0	131.2	137.7	144.2	150.6	153.7	155.5	2016	H.28	115.0	121.4	127.0	133.4	139.9	146.4	152.1	154.3	155.7
1979	S.54	114.7	120.1	125.8	131.8	137.9	144.5	149.8	154.3	155.5	2017	H.29	115.4	121.0	127.0	133.4	140.1	146.8	151.8	155.4	156.0
1980	S.55	114.8	120.5	125.6	131.6	138.5	144.9	150.6	153.6	156.1	2018	H.30	115.5	121.3	126.7	133.2	140.2	146.8	152.1	154.9	157.1
1981	S.56	114.7	120.6	126.0	131.4	138.1	145.5	150.3	154.2	155.6	2019	H.31	115.5	121.4	127.0	132.7	140.0	146.8	151.7	155.2	156.4
1982	S.57	114.7	120.6	126.2	131.6	137.7	144.8	150.4	153.7	156.0	2020	R.2									
1983	S.58	115.2	120.5	126.3	132.2	138.5	144.7	150.4	154.1	155.8	2021	R.3	115.5	121.7	127.9	134.0	140.7	146.4	151.5	155.0	156.2
1984	S.59	115.4	121.0	126.3	132.0	138.5	145.4	150.4	154.1	155.9	2022	R.4	116.3	121.7	127.9	134.7	141.4	147.7	151.3	154.5	156.6
1985	S.60	115.5	121.2	126.5	131.8	138.6	145.3	151.3	154.0	156.0	2023	R.5	116.2	122.2	127.6	134.1	141.5	147.8	152.1	154.2	155.9
1986	S.61	115.5	121.1	126.7	132.2	138.4	145.5	151.1	154.9	156.0	2024	R.6	115.5	121.8	128.0	133.8	140.8	147.8	152.3	154.8	155.8
1987	S.62	115.9	121.2	126.7	132.5	138.8	145.2	151.2	154.9	156.5											
1988	S.63	115.5	121.6	126.8	133.8	139.0	145.4	151.3	154.8	156.7											
1989	H.1	115.7	121.2	127.5	132.9	139.5	146.1	151.6	154.2	156.7											
1990	H.2	115.7	121.4	126.9	133.0	140.0	146.4	151.8	155.0	155.8											
1991	H.3	115.5	121.8	127.1	132.4	139.4	146.3	151.6	154.7	156.6											
1992	H.4	115.5	121.4	127.4	132.9	138.8	146.2	151.4	155.0	156.3											
1993	H.5	115.6	121.2	126.8	133.1	139.3	145.8	151.9	155.2	155.8											
1994	H.6	115.4	121.6	127.2	133.2	139.8	146.2	151.3	155.6	156.7											
1995	H.7	114.9	121.2	127.3	133.3	140.0	146.6	151.9	154.8	157.2											
1996	H.8	115.5	121.0	126.5	133.0	140.1	146.2	152.3	155.3	156.3											
1997	H.9	115.8	121.3	126.8	132.9	139.8	147.1	152.0	155.4	156.8											
1998	H.10	115.5	122.1	127.1	132.5	139.8	146.5	151.7	155.2	157.2											
1999	H.11	115.6	121.2	127.7	133.0	139.3	146.6	151.2	154.7	156.6											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均身長の推移（女子） 1962(昭和37)～2024(令和6)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況(男子) 年度別・年齢別平均体重の推移

(単位 kg)

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	18.9	21.3	23.3	25.8	28.7	31.6	35.5	40.8	45.5	2000	H.12	21.7	24.5	27.5	31.3	35.0	40.0	45.0	49.4	54.1
1963	S.38	19.3	21.1	23.7	24.4	28.4	31.8	35.3	41.5	46.5	2001	H.13	21.7	24.3	27.7	30.9	34.9	39.4	45.2	49.9	54.9
1964	S.39	19.2	21.3	23.5	25.4	28.9	32.1	35.8	41.9	47.6	2002	H.14	21.7	24.5	27.5	31.3	34.9	39.0	44.3	50.0	55.1
1965	S.40	19.7	21.6	24.5	26.3	29.6	32.7	37.1	42.0	48.1	2003	H.15	21.9	24.4	27.9	30.9	35.0	39.5	43.8	49.2	54.9
1966	S.41	19.6	22.0	24.1	25.6	29.2	33.3	37.3	42.6	48.1	2004	H.16	21.6	24.5	27.4	31.2	34.3	39.1	44.0	48.9	54.6
1967	S.42	19.6	21.8	24.7	26.9	30.0	32.0	37.7	43.3	48.7	2005	H.17	21.8	24.3	27.6	30.8	35.2	39.0	44.1	49.3	54.2
1968	S.43	19.7	22.1	24.4	27.8	30.3	33.9	37.7	43.7	49.5	2006	H.18	21.6	24.3	27.6	31.0	34.3	39.0	43.8	48.7	54.6
1969	S.44	19.7	22.1	24.7	27.4	31.2	33.7	38.6	43.4	50.0	2007	H.19	21.3	25.0	27.5	31.1	34.6	38.7	43.9	48.4	53.5
1970	S.45	19.9	22.2	24.8	27.7	30.6	34.9	38.6	44.3	49.6	2008	H.20	22.1	24.0	27.5	30.7	34.6	38.8	43.6	48.3	54.3
1971	S.46	20.1	22.4	24.9	27.8	31.1	34.7	40.0	44.7	50.5	2009	H.21	21.3	24.3	26.7	30.8	33.9	38.6	43.4	48.5	53.7
1972	S.47	20.2	22.6	25.3	27.9	31.1	35.2	39.7	45.8	50.7	2010	H.22	21.5	24.0	27.5	30.0	34.4	38.2	43.8	48.5	53.6
1973	S.48	20.3	22.8	25.3	28.4	31.3	35.1	40.4	45.1	51.6	2011	H.23	21.5	24.0	26.8	30.6	33.3	38.4	43.0	48.3	53.3
1974	S.49	19.9	22.3	25.2	28.7	31.3	34.1	39.8	45.9	50.8	2012	H.24	21.4	24.3	27.1	30.2	34.4	37.7	43.9	47.8	53.7
1975	S.50	20.4	22.7	25.6	28.6	31.7	35.4	39.7	45.2	51.0	2013	H.25	21.3	24.2	27.2	30.3	33.6	38.7	42.6	48.2	52.9
1976	S.51	20.4	23.0	25.8	28.8	32.3	35.7	40.5	45.0	51.2	2014	H.26	21.0	24.1	27.0	30.5	34.1	38.1	43.8	47.2	53.7
1977	S.52	20.2	22.6	25.5	28.6	31.9	35.7	40.2	46.0	51.3	2015	H.27	21.2	23.7	27.2	30.6	34.2	38.6	43.3	48.2	52.5
1978	S.53	20.4	22.7	25.6	28.5	32.0	35.6	41.0	45.9	51.8	2016	H.28	21.1	23.8	26.7	30.8	34.4	38.6	44.1	48.2	53.3
1979	S.54	20.6	23.0	25.3	28.8	32.1	36.1	40.8	46.9	51.7	2017	H.29	21.6	23.9	26.8	30.4	34.5	38.6	43.8	48.2	53.0
1980	S.55	20.5	23.2	25.8	28.3	32.3	36.2	41.0	46.2	52.6	2018	H.30	21.3	24.3	26.9	30.2	34.3	38.9	43.7	48.6	53.6
1981	S.56	20.8	23.0	26.1	28.7	31.6	36.2	41.3	46.6	51.8	2019	H.31	21.4	24.1	27.6	30.5	33.8	39.0	44.4	48.6	53.5
1982	S.57	20.9	23.3	25.8	29.2	32.2	35.4	41.4	47.1	52.2	2020	R.2									
1983	S.58	21.1	23.5	26.2	29.0	32.9	36.2	41.3	46.6	52.5	2021	R.3	21.7	24.8	27.4	31.2	35.6	39.2	43.9	49.6	54.4
1984	S.59	20.8	23.6	26.1	29.2	32.5	37.0	41.2	46.5	52.1	2022	R.4	21.8	24.6	28.2	31.0	35.4	40.6	45.0	49.5	55.0
1985	S.60	20.9	23.4	26.6	29.3	32.8	36.6	42.0	47.0	52.1	2023	R.5	21.9	24.4	27.7	31.7	34.7	39.9	45.8	49.4	54.0
1986	S.61	21.0	23.5	26.3	29.8	33.0	36.9	42.0	47.3	52.7	2024	R.6	21.4	24.7	27.7	31.2	35.8	38.9	45.0	50.5	53.7
1987	S.62	21.3	23.5	26.4	29.7	33.4	37.0	42.4	47.3	53.1											
1988	S.63	21.3	23.8	26.3	29.7	33.3	37.6	42.9	47.1	52.5											
1989	H.1	21.4	23.8	27.0	30.0	33.3	37.8	43.0	48.4	53.6											
1990	H.2	21.9	23.9	27.1	30.4	33.6	37.6	43.4	48.3	53.7											
1991	H.3	21.5	24.4	26.9	30.3	33.8	37.8	43.3	48.5	53.6											
1992	H.4	21.4	24.3	27.5	30.2	33.7	38.1	43.9	48.5	53.9											
1993	H.5	21.7	24.1	27.6	30.9	33.8	38.3	43.6	49.0	53.9											
1994	H.6	21.6	24.4	27.3	31.0	34.4	37.8	43.7	48.5	54.4											
1995	H.7	21.9	24.5	27.6	30.6	34.4	38.8	43.4	49.2	53.9											
1996	H.8	21.8	24.8	27.8	31.1	34.3	39.1	44.9	48.7	54.3											
1997	H.9	21.6	24.5	28.0	31.0	34.9	38.8	45.2	50.2	54.0											
1998	H.10	21.4	24.4	27.6	31.4	35.3	39.5	44.2	50.7	55.8											
1999	H.11	21.7	24.2	27.8	31.3	35.5	39.8	44.3	49.4	55.9											

※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)したがって、伊勢市HPにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（男子） 1962(昭和37)～2024(令和6)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)


伊勢市の児童生徒発育状況（女子） 年度別・年齢別平均体重の推移

（単位 kg）

年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	年度		6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才
1962	S.37	18.5	20.8	22.9	25.7	28.6	32.7	37.4	42.8	45.8	2000	H.12	21.1	23.7	26.9	30.9	34.4	39.1	44.5	47.2	49.7
1963	S.38	18.7	20.1	23.0	25.7	28.8	33.0	38.2	42.4	46.0	2001	H.13	21.1	23.6	26.6	30.1	35.1	39.2	43.6	47.2	49.9
1964	S.39	19.6	20.9	23.0	26.0	29.1	32.0	38.0	42.6	45.7	2002	H.14	20.7	23.7	26.8	30.0	34.7	40.2	43.6	46.7	50.1
1965	S.40	19.1	21.0	23.5	26.1	29.6	33.6	38.6	43.1	46.6	2003	H.15	21.3	23.3	26.7	30.2	34.7	39.7	43.7	47.0	49.7
1966	S.41	19.1	21.2	22.8	26.3	29.6	34.2	38.6	43.0	46.7	2004	H.16	21.1	23.7	26.1	30.1	34.2	38.6	43.8	47.2	49.6
1967	S.42	19.1	21.3	23.7	26.5	30.0	34.1	39.2	43.3	46.8	2005	H.17	21.1	23.6	26.7	29.5	34.3	39.3	42.9	47.1	50.2
1968	S.43	19.3	21.5	24.1	27.0	30.5	34.8	39.7	44.1	47.2	2006	H.18	21.1	23.7	26.4	30.1	33.9	39.4	43.6	46.3	49.5
1969	S.44	19.3	21.7	24.2	27.0	30.8	35.1	39.9	44.3	47.6	2007	H.19	21.1	23.8	26.9	29.9	34.2	38.9	43.6	47.2	49.1
1970	S.45	19.4	21.5	24.3	26.9	30.7	35.7	40.0	44.4	47.9	2008	H.20	21.0	23.8	26.7	30.4	34.1	39.0	43.6	47.0	50.5
1971	S.46	19.5	21.8	24.3	27.7	30.9	35.8	40.9	44.7	48.2	2009	H.21	21.0	23.3	26.6	30.0	34.4	38.7	43.1	46.8	49.9
1972	S.47	19.8	22.2	24.6	27.3	31.9	36.0	41.0	45.5	48.2	2010	H.22	21.0	23.7	26.4	30.1	34.0	39.6	43.0	46.2	49.5
1973	S.48	19.6	22.2	25.0	27.9	31.8	36.9	41.3	45.5	48.7	2011	H.23	20.9	23.5	26.4	29.5	34.2	38.7	43.8	46.6	49.1
1974	S.49	19.6	21.5	24.7	27.7	31.2	36.1	41.9	45.6	48.5	2012	H.24	20.7	23.6	26.3	29.9	33.7	39.1	43.3	47.4	49.5
1975	S.50	19.9	22.4	24.8	28.3	33.3	36.7	41.4	46.0	48.0	2013	H.25	20.7	23.1	26.4	29.5	33.9	38.7	43.4	46.2	50.1
1976	S.51	20.0	22.4	25.2	27.9	32.4	37.2	41.1	46.1	49.3	2014	H.26	20.6	23.2	26.0	29.7	34.0	39.2	43.2	46.9	49.1
1977	S.52	20.0	22.3	25.1	27.9	31.6	37.7	42.1	45.8	48.9	2015	H.27	20.8	23.2	26.4	29.5	33.7	39.1	43.5	46.7	49.4
1978	S.53	19.9	22.3	25.1	28.3	32.0	36.3	42.4	46.1	49.0	2016	H.28	20.6	23.5	26.3	29.9	33.7	38.9	43.4	47.1	49.4
1979	S.54	20.0	22.3	25.2	28.4	32.5	37.0	41.8	46.6	49.4	2017	H.29	20.9	23.2	26.5	30.0	33.9	38.7	43.3	46.6	49.6
1980	S.55	20.2	22.4	25.1	28.4	32.2	37.4	42.2	45.8	49.4	2018	H.30	21.0	23.4	26.1	30.1	34.1	39.0	43.1	46.7	49.4
1981	S.56	20.3	22.6	25.1	28.3	32.4	37.5	41.9	45.9	49.0	2019	H.31	21.1	23.7	26.5	29.6	34.6	39.0	43.1	46.6	49.5
1982	S.57	20.2	22.8	25.4	28.5	32.2	37.4	42.4	45.8	48.8	2020	R.2									
1983	S.58	20.3	22.7	25.8	28.7	32.7	37.2	42.9	46.3	49.1	2021	R.3	21.2	23.8	27.0	30.7	34.8	38.9	43.8	46.9	49.2
1984	S.59	20.4	22.9	25.4	29.1	32.7	37.7	42.4	46.6	49.4	2022	R.4	21.2	23.9	27.2	31.1	35.4	40.3	43.3	47.0	49.4
1985	S.60	20.4	22.9	25.7	28.7	33.1	37.6	43.1	46.1	50.0	2023	R.5	21.2	23.7	26.9	30.8	35.3	40.3	44.2	46.2	49.3
1986	S.61	20.5	22.9	25.7	28.9	32.8	38.4	43.1	46.9	49.1	2024	R.6	21.2	23.7	26.9	30.6	35.0	40.1	44.0	46.9	48.4
1987	S.62	20.8	23.1	25.9	29.2	33.0	37.6	43.7	46.9	49.9											
1988	S.63	20.7	23.4	26.0	29.3	33.6	38.0	42.7	47.0	50.0											
1989	H.1	20.7	23.2	26.4	30.0	33.8	38.9	43.8	46.0	50.3											
1990	H.2	20.8	23.2	26.2	29.8	34.1	38.9	43.9	46.8	48.7											
1991	H.3	21.1	23.4	26.2	29.2	34.0	39.4	43.9	47.5	49.8											
1992	H.4	21.3	23.6	26.4	29.7	33.5	39.2	44.2	47.3	50.2											
1993	H.5	21.1	23.7	26.5	30.1	33.9	38.6	44.3	47.4	50.1											
1994	H.6	21.0	23.7	26.9	30.1	34.0	38.9	43.8	47.5	50.2											
1995	H.7	20.8	23.5	26.7	30.4	34.5	39.0	44.1	46.7	50.1											
1996	H.8	21.1	23.5	26.5	30.4	35.4	39.5	44.4	47.3	49.6											
1997	H.9	21.5	23.5	26.4	29.8	34.5	40.1	44.8	47.5	49.8											
1998	H.10	21.2	24.2	26.6	29.8	34.3	39.7	44.7	47.9	50.3											
1999	H.11	21.2	23.9	27.4	30.2	34.0	39.7	44.0	47.3	50.3											

※2006（平成18）年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。（各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出）したがって、伊勢市HPIにアップされている2009年度版と数値が異なっている。

年度別平均体重の推移（女子）1962(昭和37)～2024(令和6)年度



※2006(平成18)年度より 伊勢市全体の平均値算出方法を変更。(各校平均値の合計を校数で割っていたものを総合計値を総人数で割って算出)

2024(令和6)年度 健康状態 小学校・中学校 男女別 全体

項目		年齢	小学校男子	(%)	小学校女子	(%)	小学校合計	(%)	中学校男子	(%)	中学校女子	(%)	中学校合計	(%)
1 調査対象者数			2803		2676		5479		1546		1444		2990	
2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数		2795	99.71%	2670	99.78%	5465	99.74%	1523	98.51%	1428	98.89%	2951	98.70%
	① 脊柱異常		28	1.00%	29	1.09%	57	1.04%	37	2.43%	63	4.41%	100	3.39%
	② 胸郭異常		2	0.07%	3	0.11%	5	0.09%	2	0.13%	0	0.00%	2	0.07%
	③ 四肢異常		6	0.21%	6	0.22%	12	0.22%	39	2.56%	12	0.84%	51	1.73%
3 栄養	受検者数		2798	99.82%	2671	99.81%	5469	99.82%	1529	98.90%	1436	99.45%	2965	99.16%
	① やせ-20%以下		39	1.39%	44	1.65%	83	1.52%	79	5.17%	71	4.94%	150	5.06%
	② 軽度肥満20%以上30%未満		139	4.97%	110	4.12%	249	4.55%	76	4.97%	55	3.83%	131	4.42%
	③ 中等度肥満30%以上50%未満		108	3.86%	72	2.70%	180	3.29%	57	3.73%	32	2.23%	89	3.00%
	④ 高度肥満50%以上		27	0.96%	19	0.71%	46	0.84%	23	1.50%	7	0.49%	30	1.01%
4 視力	受検者数		2790	99.54%	2665	99.59%	5455	99.56%	1529	98.90%	1435	99.38%	2964	99.13%
	裸眼	① A 1.0以上	1720	61.65%	1425	53.47%	3145	57.65%	618	40.42%	451	31.43%	1069	36.07%
		② B 0.9～0.7	351	12.58%	397	14.90%	748	13.71%	153	10.01%	124	8.64%	277	9.35%
		③ C 0.6～0.3	302	10.82%	319	11.97%	621	11.38%	193	12.62%	144	10.03%	337	11.37%
		④ D 0.2以下	132	4.73%	129	4.84%	261	4.78%	83	5.43%	61	4.25%	144	4.86%
	矯正	① A 1.0以上	83	2.97%	112	4.20%	195	3.57%	184	12.03%	227	15.82%	411	13.87%
		② B 0.9～0.7	61	2.19%	111	4.17%	172	3.15%	148	9.68%	206	14.36%	354	11.94%
		③ C 0.6～0.3	110	3.94%	142	5.33%	252	4.62%	133	8.70%	199	13.87%	332	11.20%
		④ D 0.2以下	31	1.11%	30	1.13%	61	1.12%	17	1.11%	23	1.60%	40	1.35%
5 眼	受検者数		2789	99.50%	2662	99.48%	5451	99.49%	1503	97.22%	1417	98.13%	2920	97.66%
	疾病・異常者数		82	2.94%	77	2.89%	159	2.92%	46	3.06%	28	1.98%	74	2.53%
6 聴力	受検者数		1787	99.72%	1731	99.77%	3518	64.21%	1050	99.06%	942	99.37%	1992	66.62%
	疾病・異常者数		7	0.39%	9	0.52%	16	0.45%	6	0.57%	2	0.21%	8	0.40%
7 耳鼻 咽頭	受検者数		934	99.89%	831	99.28%	1765	32.21%	527	98.87%	461	99.57%	988	33.04%
	① 耳疾患		77	8.24%	64	7.70%	141	7.99%	54	10.25%	20	4.34%	74	7.49%
	② 鼻・副鼻腔疾患		270	28.91%	137	16.49%	407	23.06%	141	26.76%	86	18.66%	227	22.98%
	③ 口腔咽喉頭疾患・異常		37	3.96%	19	2.29%	56	3.17%	9	1.71%	4	0.87%	13	1.32%
8 皮膚	受検者数		2803	100.00%	2676	100.00%	5479	100.00%	1546	100.00%	1444	100.00%	2990	100.00%
	① アトピー性皮膚炎		220	7.85%	194	7.25%	414	7.56%	89	5.76%	73	5.06%	162	5.42%
	② その他の皮膚疾患		15	0.54%	15	0.56%	30	0.55%	19	1.23%	20	1.39%	39	1.30%
9 心電 図	受検者数		933	99.79%	836	99.88%	1769	32.29%	530	99.44%	461	99.57%	991	33.14%
	疾病・異常者数		63	6.75%	47	5.62%	110	6.22%	60	11.32%	32	6.94%	92	9.28%
10 心臓	受検者数		2697	96.22%	2570	96.04%	5267	96.13%	1516	98.06%	1429	98.96%	2945	98.49%
	疾病・異常者数		50	1.85%	45	1.75%	95	1.80%	49	3.23%	41	2.87%	90	3.06%
11 その他	受検者数		2799	99.86%	2673	99.89%	5472	99.87%	1546	100.00%	1444	100.00%	2990	100.00%
	① 喘息		176	6.29%	103	3.85%	279	5.10%	71	4.59%	44	3.05%	115	3.85%
	② その他の疾病・異常		172	6.15%	142	5.31%	314	5.74%	95	6.14%	75	5.19%	170	5.69%
12 歯・ 口腔	受検者数		2792	99.61%	2661	99.44%	5453	99.53%	1518	98.19%	1423	98.55%	2941	98.36%
	う 歯	① なしの者	1648	59.03%	1598	60.05%	3246	59.53%	1078	71.01%	945	66.41%	2023	68.79%
		② 処置完了者	463	16.58%	458	17.21%	921	16.89%	210	13.83%	231	16.23%	441	14.99%
		③ 未処置歯のある者	681	24.39%	605	22.74%	1286	23.58%	230	15.15%	247	17.36%	477	16.22%
	④ 歯列・咬合		85	3.04%	85	3.19%	170	3.12%	78	5.14%	71	4.99%	149	5.07%
	⑤ 顎関節		1	0.04%	2	0.08%	3	0.06%	4	0.26%	6	0.42%	10	0.34%
	⑥ 歯垢の状態		95	3.40%	65	2.44%	160	2.93%	78	5.14%	51	3.58%	129	4.39%
	⑦ 歯肉異常		37	1.33%	34	1.28%	71	1.30%	59	3.89%	36	2.53%	95	3.23%
	⑧ その他の疾病・異常		407	14.58%	394	14.81%	801	14.69%	173	11.40%	129	9.07%	302	10.27%

・9 心電図は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
・2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

2024(令和6)年度 健康状態年齢別男女別 -小学校-

項目		年齢	男 子							項目		年齢	女 子																	
			6才	7才	8才	9才	10才	11才	計				%	6才	7才	8才	9才	10才	11才	計	%									
1 調査対象者数			422	459	444	513	467	498	2803		1 調査対象者数			385	421	478	452	451	489	2676										
2 脊 柱 胸 郭 四 肢	受検者数		422	458	443	511	464	497	2795	99.71%	2 脊 柱 胸 郭 四 肢	受検者数		384	421	477	452	449	487	2670	99.78%									
	① 脊柱異常		3	2	4	4	5	10	28	1.00%		3 栄 養	① 脊柱異常		3	4	4	5	7	6	29	1.09%								
	② 胸郭異常		1	0	1	0	0	0	2	0.07%			3 栄 養	② 胸郭異常		0	0	0	2	1	0	3	0.11%							
	③ 四肢異常		0	0	1	2	1	2	6	0.21%				3 栄 養	③ 四肢異常		1	0	1	1	1	2	6	0.22%						
	受検者数		422	458	443	512	466	497	2798	99.82%					3 栄 養	受検者数		385	421	478	452	449	486	2671	99.81%					
① やせ-20%以下		2	1	4	7	10	15	39	1.39%	3 栄 養	① やせ-20%以下					2	3	3	10	10	16	44	1.65%							
② 軽度肥満20%以上30%未満		15	20	21	27	33	23	139	4.97%		3 栄 養	② 軽度肥満20%以上30%未満				15	13	14	22	21	25	110	4.12%							
③ 中等度肥満30%以上50%未満		7	8	19	26	25	23	108	3.86%			3 栄 養	③ 中等度肥満30%以上50%未満			3	13	10	18	12	16	72	2.70%							
④ 高度肥満50%以上		1	4	3	5	10	4	27	0.96%				3 栄 養	④ 高度肥満50%以上		3	0	4	3	5	4	19	0.71%							
4 視 力	受検者数		421	456	442	511	465	495	2790					99.54%	4 視 力	受検者数		385	420	475	452	448	485	2665	99.59%					
	裸 眼	① A 1.0以上	314	309	301	291	255	250	1720	61.65%				4 視 力		裸 眼	① A 1.0以上	267	262	271	222	213	190	1425	53.47%					
		② B 0.9～0.7	65	74	68	53	40	51	351	12.58%	4 視 力						裸 眼	② B 0.9～0.7	75	87	75	56	49	55	397	14.90%				
		③ C 0.6～0.3	30	49	29	77	63	54	302	10.82%		4 視 力						裸 眼	③ C 0.6～0.3	28	42	63	72	59	55	319	11.97%			
		④ D 0.2以下	5	16	24	37	31	19	132	4.73%			4 視 力						裸 眼	④ D 0.2以下	3	15	25	28	27	31	129	4.84%		
	矯 正	① A 1.0以上	4	3	4	14	25	33	83	2.97%						4 視 力				矯 正	① A 1.0以上	4	5	10	16	27	50	112	4.20%	
		② B 0.9～0.7	2	1	3	10	19	26	61	2.19%							4 視 力				矯 正	② B 0.9～0.7	3	5	13	23	23	44	111	4.17%
		③ C 0.6～0.3	0	4	10	24	22	50	110	3.94%								4 視 力				矯 正	③ C 0.6～0.3	4	3	16	28	41	50	142
		④ D 0.2以下	1	0	3	5	10	12	31	1.11%									4 視 力				矯 正	④ D 0.2以下	1	1	2	7	9	10
5 眼	受検者数	422	457	440	513	462	495	2789	99.50%	5 眼					受検者数					384				419	475	452	450	482	2662	99.48%
	疾病・異常者数		6	13	14	19	15	15	82					2.94%	5 眼					疾病・異常者数				9	14	11	21	9	13	77
6 聴 力	受検者数	422	458	441		466		1787	99.72%	6 聴 力	受検者数			385						421	477			448		1731	99.77%			
	疾病・異常者数		3	2	0		2		7		0.39%	6 聴 力		疾病・異常者数						4	2	1		2		9	0.52%			
7 耳 鼻 咽 頭	受検者数	422			512			934	99.89%	7 耳 鼻 咽 頭	受検者数		382							449			831	99.28%						
	① 耳疾患	43			34			77	8.24%		7 耳 鼻 咽 頭	① 耳疾患		41						23			64	7.70%						
	② 鼻・副鼻腔疾患	118			152			270	28.91%			7 耳 鼻 咽 頭	② 鼻・副鼻腔疾患		59					78			137	16.49%						
	③ 口腔咽喉頭疾患・異常	26			11			37	3.96%				7 耳 鼻 咽 頭	③ 口腔咽喉頭疾患・異常		10				9			19	2.29%						
8 皮 膚	受検者数	422	459	444	513	467	498	2803	100.00%	8 皮 膚				受検者数		385	421	478	452	451	489	2676	100.00%							
	① アトピー性皮膚炎	48	28	24	45	37	38	220	7.85%		8 皮 膚			① アトピー性皮膚炎		30	31	28	36	32	37	194	7.25%							
	② その他の皮膚疾患	2	1	6	2	1	3	15	0.54%			8 皮 膚		② その他の皮膚疾患		0	4	5	4	0	2	15	0.56%							
9 心 電 図	受検者数	421			512			933	99.79%	9 心 電 図			受検者数		385			451			836	99.88%								
	疾病・異常者数		27			36			63		6.75%		9 心 電 図	疾病・異常者数		20			27			47	5.62%							
10 心 臓	受検者数	421	433	424	512	439	468	2697	96.22%	10 心 臓	受検者数			383	404	453	450	423	457	2570	96.04%									
	疾病・異常者数		8	8	6	8	7	13	50		1.85%	10 心 臓	疾病・異常者数		4	7	4	15	8	7	45	1.75%								
11 そ の 他	受検者数	422	459	443	513	465	497	2799	99.86%	11 そ の 他	受検者数		385	421	477	452	451	487	2673	99.89%										
	① 喘息	27	26	43	30	27	23	176	6.29%		11 そ の 他	① 喘息		23	19	18	7	14	22	103	3.85%									
	② その他の疾病・異常	35	24	25	27	27	34	172	6.15%			11 そ の 他	② その他の疾病・異常		20	28	31	28	17	18	142	5.31%								
12 歯・ 口 腔	受検者数	421	458	442	512	463	496	2792	99.61%	12 歯・ 口 腔			受検者数		384	417	475	450	448	487	2661	99.44%								
	う 歯	① なしの者	276	260	239	270	270	333	1648		59.03%		12 歯・ 口 腔	う 歯	① なしの者	248	270	259	217	270	334	1598	60.05%							
		② 処置完了者	29	64	85	110	100	75	463		16.58%	12 歯・ 口 腔			う 歯	② 処置完了者	33	52	101	111	77	84	458	17.21%						
		③ 未処置歯のある者	116	134	118	132	93	88	681		24.39%					12 歯・ 口 腔	う 歯	③ 未処置歯のある者	103	95	115	122	101	69	605	22.74%				
	④ 歯列・咬合	3	11	12	20	17	22	85	3.04%		12 歯・ 口 腔			④ 歯列・咬合				5	13	17	29	14	7	85	3.19%					
	⑤ 顎関節	0	0	0	0	1	0	1	0.04%					12 歯・ 口 腔	⑤ 顎関節			0	0	0	0	1	1	2	0.08%					
	⑥ 歯垢の状態	3	5	5	25	27	30	95	3.40%						12 歯・ 口 腔		⑥ 歯垢の状態	1	4	7	17	12	24	65	2.44%					
	⑦ 歯肉異常	0	0	0	18	13	6	37	1.33%								12 歯・ 口 腔	⑦ 歯肉異常	0	1	3	9	9	12	34	1.28%				
	⑧ その他の疾病・異常	35	50	50	87	88	97	407	14.58%									12 歯・ 口 腔	⑧ その他の疾病・異常	36	61	69	86	69	73	394	14.81%			


・9 心電図は、2017(平成29)年度より小4が加わった。
・2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。

2024(令和6)年度 健康状態年齢別男女別 -中学校-


項目		年齢	男 子					項目		年齢	女 子						
			12才	13才	14才	計	(%)				12才	13才	14才	計	(%)		
1 調査対象者数			533	486	527	1546		1 調査対象者数			463	496	485	1444			
2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数		529	475	519	1523	98.51%	2 脊柱 胸郭 四肢	受検者数		461	488	479	1428	98.89%		
	① 脊柱異常		10	7	20	37	2.43%		① 脊柱異常		11	33	19	63	4.41%		
	② 胸郭異常		0	1	1	2	0.13%		② 胸郭異常		0	0	0	0	0.00%		
	③ 四肢異常		10	16	13	39	2.56%		③ 四肢異常		2	5	5	12	0.84%		
3 栄養	受検者数		531	479	519	1529	98.90%	3 栄養	受検者数		463	493	480	1436	99.45%		
	① やせ-20%以下		35	25	19	79	5.17%		① やせ-20%以下		23	28	20	71	4.94%		
	② 軽度肥満20%以上30%未満		32	22	22	76	4.97%		② 軽度肥満20%以上30%未満		20	18	17	55	3.83%		
	③ 中等度肥満30%以上50%未満		23	20	14	57	3.73%		③ 中等度肥満30%以上50%未満		11	14	7	32	2.23%		
	④ 高度肥満50%以上		10	10	3	23	1.50%		④ 高度肥満50%以上		1	4	2	7	0.49%		
4 視力	受検者数		531	479	519	1529	98.90%	4 視力	受検者数		462	493	480	1435	99.38%		
	裸眼	① A 1.0以上	247	192	179	618	40.42%		裸眼	① A 1.0以上	159	167	125	451	31.43%		
		② B 0.9～0.7	44	50	59	153	10.01%			裸眼	② B 0.9～0.7	50	39	35	124	8.64%	
		③ C 0.6～0.3	57	71	65	193	12.62%				裸眼	③ C 0.6～0.3	47	51	46	144	10.03%
		④ D 0.2以下	32	21	30	83	5.43%					裸眼	④ D 0.2以下	18	23	20	61
	矯正	① A 1.0以上	59	53	72	184	12.03%		矯正				① A 1.0以上	69	65	93	227
		② B 0.9～0.7	44	43	61	148	9.68%			矯正			② B 0.9～0.7	52	65	89	206
		③ C 0.6～0.3	42	45	46	133	8.70%				矯正		③ C 0.6～0.3	59	74	66	199
④ D 0.2以下		6	4	7	17	1.11%	矯正	④ D 0.2以下				8	9	6	23	1.60%	
5 眼	受検者数		525	467	511	1503		97.22%	5 眼			受検者数		460	483	474	1417
	疾病・異常者数		21	11	14	46		3.06%		疾病・異常者数		12	9	7	28	1.98%	
6 聴力	受検者数		531		519	1050		99.06%	6 聴力	受検者数		462		480	942	99.37%	
	疾病・異常者数		3		3	6	0.57%	疾病・異常者数		2		0	2	0.21%			
7 耳鼻 咽頭	受検者数		527			527	98.87%	7 耳鼻 咽頭	受検者数		461			461	99.57%		
	① 耳疾患		54			54	10.25%		① 耳疾患		20			20	4.34%		
	② 鼻・副鼻腔疾患		141			141	26.76%		② 鼻・副鼻腔疾患		86			86	18.66%		
	③ 口腔咽喉頭疾患・異常		9			9	1.71%		③ 口腔咽喉頭疾患・異常		4			4	0.87%		
8 皮膚	受検者数		533	486	527	1546	100.00%	8 皮膚	受検者数		463	496	485	1444	100.00%		
	① アトピー性皮膚炎		42	21	26	89	5.76%		① アトピー性皮膚炎		27	15	31	73	5.06%		
	② その他の皮膚疾患		0	4	15	19	1.23%		② その他の皮膚疾患		0	8	12	20	1.39%		
9 心電 図	受検者数		530			530	99.44%	9 心電 図	受検者数		461			461	99.57%		
	疾病・異常者数		60			60	11.32%		疾病・異常者数		32			32	6.94%		
10 心臓	受検者数		522	475	519	1516	98.06%	10 心臓	受検者数		459	490	480	1429	98.96%		
	疾病・異常者数		18	12	19	49	3.23%		疾病・異常者数		11	18	12	41	2.87%		
11 その他	受検者数		533	486	527	1546	100.00%	11 その他	受検者数		463	496	485	1444	100.00%		
	① 喘息		24	18	29	71	4.59%		① 喘息		19	12	13	44	3.05%		
	② その他の疾病・異常		34	29	32	95	6.14%		② その他の疾病・異常		16	27	32	75	5.19%		
12 歯・ 口腔	受検者数		527	473	518	1518	98.19%	12 歯・ 口腔	受検者数		461	486	476	1423	98.55%		
	う 歯	① なしの者	402	300	376	1078	71.01%		う 歯	① なしの者	333	292	320	945	66.41%		
		② 処置完了者	63	75	72	210	13.83%			う 歯	② 処置完了者	74	85	72	231	16.23%	
		③ 未処置歯のある者	62	98	70	230	15.15%				う 歯	③ 未処置歯のある者	54	109	84	247	17.36%
	④ 歯列・咬合		24	21	33	78	5.14%		④ 歯列・咬合			10	19	42	71	4.99%	
	⑤ 顎関節		0	1	3	4	0.26%		⑤ 顎関節			1	2	3	6	0.42%	
	⑥ 歯垢の状態		15	19	44	78	5.14%		⑥ 歯垢の状態		9	15	27	51	3.58%		
	⑦ 歯肉異常		10	16	33	59	3.89%		⑦ 歯肉異常		5	11	20	36	2.53%		
	⑧ その他の疾病・異常		87	53	33	173	11.40%		⑧ その他の疾病・異常		51	41	37	129	9.07%		

・2021(R3)年度より、各項目ごとに受検者数を表記している。


やせ 年度別推移 1993(平成5)～2024(令和6)年度



※伊勢市では1999(平成11)年度から、1993(平成5)年度の標準体重を使用している。
※2017(平成29)年度から、身長別標準体重を求める係数と計算式を使用している。




肥満 年度別推移 1993(平成5)～2024(令和6)年度




※伊勢市では1999(平成11)年度から、1993(平成5)年度の標準体重を使用している。
※2017(平成29)年度から、身長別標準体重を求める係数と計算式を使用している。


肥満の被患率 2024(令和6)年度



2024(令和6)年度 年齢別視力の割合




喘息 年度別推移 1993(平成5)～2024(令和6)年度




※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

アトピー性皮膚炎 年度別推移 1993(平成5)～2024(令和6)年度



※2011(平成23)年度から、「医療機関で治療中または経過観察中の者」「本年度の保健調査であがってくる者」とした。

未処置歯保有者の割合 年度別推移 1980(昭和55)～2024(令和6)年度



2024(令和6)年度 年齢別歯の状態の割合

